

Vorschlag der deutschen Naturschutzverbände über die Auswahl

von Gebieten Gemeinschaftlicher Bedeutung

Im Sinne Anhang III, Phase 2 der FFH-Richtlinie

Michael Gerhard & Matthias Schreiber

(Bramsche und Oberhausen, 03.03.03)

Einleitung

Im wissenschaftlichen Bewertungstreffen vom 05.-07.06.2002 in Den Haag waren für den deutschen Anteil der atlantischen Region der Europäischen Union verschiedene Defizite festgestellt worden (siehe Protokoll des Bewertungstreffens vom Juli 2002), die zu einem nicht unerheblichen Teil durch die Meldung weiterer Gebiete bzw. Erweiterungen bestehender Gebietsvorschläge zu schließen sind.

Für diese Nachmeldung haben die deutschen Naturschutzverbände im Juli 2002 einen Verfahrensvorschlag vorgelegt und mehrfach mit den Ländern diskutiert (siehe Schreiber et al. 2002). Die aus diesem Verfahrensvorschlag resultierenden Gebietsvorschläge sind nachfolgend dokumentiert.

Material und Methode

Dem Auswahlverfahren wurde die Gesamtheit der FFH-Verbändeliste und die offiziellen Meldungen zugrunde gelegt. Ergänzend wurde für Nordrhein-Westfalen eine Revision der Datenbestände der FFH-Verbändeliste vorgenommen, da seit Abschluss der Verbändeliste verschiedene neuere Materialien bekannt und auch ein Abgleich mit den jüngeren Abgrenzungen der offiziellen Meldungen erforderlich geworden waren.

Das Verfahren der Gebietsauswahl

Spätestens, nachdem der deutschen Vorschlagsliste im atlantischen Bewertungsseminar vom 5.-7. Juni 2002 in Den Haag für nur etwa ein Viertel der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II ein „ausreichend“ bescheinigt wurde, ist die Notwendigkeit weiterer Gebietsvorschläge für das Schutzgebietsnetz Natura 2000 unabweisbar. Da die Verpflichtung zur Benennung der Vorschlagsgebiete bereits seit 10 Jahren bekannt und die in der Richtlinie vorgegebene Frist zur Erstellung einer umfassenden und vollständigen Vorschlagsliste seit 1995 abgelaufen ist (Phase 1 im Anhang 3 der FFH-Richtlinie), ist angesichts der herrschenden Rechtsunsicherheit und der Absicht der EU-Kommission, die Gemeinschaftsliste für die atlantische Region im Frühjahr 2003 abzuschließen, ein rasches und koordiniertes Vorgehen aller Beteiligten (Länder, Bund, und Naturschutzorganisationen) gefordert, um endlich mit der inhaltlichen Ausgestaltung des Schutzgebietsnetzes beginnen zu können.

Um den nachfolgenden Verfahrensvorschlag richtig einordnen zu können, soll kurz der in der FFH-Richtlinie vorgesehene Ablauf zur Aufstellung des Netzwerkes Natura 2000 in Erinnerung gerufen und der aktuell erreichte Stand beschrieben werden.

Die FFH-Richtlinie sieht in Artikel 4 (in Verbindung mit Anhang III) ein zweistufiges Verfahren vor, in dem in Phase 1 eine Vorschlagsliste aufzustellen ist. Sie muss nach Auffassung der Kommission „so viele

Gebiete wie möglich“ enthalten, sie muss umfassend und vollständig sein, wie der EuGH in seinem Urteil gegen Deutschland und der Generalanwalt im dazugehörigen Schlussantrag dargelegt hat. Die Vorschlagsliste muss alle Gebiete enthalten, die geeignet sind, in das Netzwerk Natura 2000 aufgenommen zu werden. Aus dieser Vorschlagsliste wird in Phase 2 bei den biogeographischen Bewertungstreffen die Auswahl für das Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ getroffen.

Die Praxis der Bewertungsseminare zeigt, dass Phase 1 und 2 in einem fließenden Übergang abgehandelt werden: Sind ein hoher Prozentsatz der in einem Mitgliedstaat bekannten Bestände und eine größere Zahl von Gebieten in einer gleichmäßigen Verteilung gemeldet, ist die Meldung ausreichend, also war auch die Vorschlagsliste ausreichend, ohne dass letzteres vorher ausdrücklich festgestellt worden wäre. Wird umgekehrt „unzureichend“ bescheinigt, war naturgemäß auch die Vorschlagsliste unzureichend und muss nachgebessert werden. In diesem Stadium befindet sich die deutsche Gebietsmeldung für verschiedene Lebensraumtypen bzw. Arten der atlantischen Region derzeit.

In der Praxis wird dem Mitgliedstaat von der Europäischen Kommission also die Vorauswahl der Gebiete übertragen, die nach Vorbereitung durch das ETC in Paris in den Bewertungsseminaren einer Überprüfung unterzogen wird. Für das für Deutschland abschließende Bewertungsseminar der atlantischen Region, das (aufgrund der im Gegensatz zu den übrigen Mitgliedstaaten besonders großen Rückstände) bilateral zwischen der Europäischen Kommission bzw. dem ETC und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden soll, wird deshalb nicht so sehr eine Vorschlagsliste für eine Auswahl als vielmehr eine Auswahl selbst gefordert sein, die den Ansprüchen der bisherigen Bewertungsseminare genügt.

Dafür schlagen die deutschen Naturschutzverbände als Auswahlverfahren die nachfolgend beschriebenen Schritte für die Lebensraumtypen und Habitate der Arten vor, bei denen die Meldung der Bundesrepublik Deutschland im Bewertungsseminar in Den Haag mit „I mod“, „I mod G“ oder „I major“ („I“ steht für „Insufficient“) eingestuft wurde. Das Verfahren wäre bei entsprechenden Ergebnissen der Nachprüfung auch auf die Arten und Lebensraumtypen anzuwenden, bei denen „scientific reserve“ festgesetzt wurde. Für die beiden naturräumlichen Haupteinheiten D34 und D35 wurde dies exemplarisch bereits für die unter „scientific reserve“ geführten Lebensraumtypen durchgeführt.

Kriterien für die Auswahl von pSCI

Die deutschen Naturschutzverbände setzen bei der Vervollständigung der nationalen Gebietsauswahl auf einen einheitlichen Katalog von Kriterien, weil damit mehrere Vorteile kombiniert werden: Man wird damit am ehesten der Anforderung der Richtlinie nach einer fachlichen Auswahl gerecht, ermöglicht eine transparente Gebietsauswahl, macht also das Vorgehen für die betroffene Öffentlichkeit nachvollziehbar, gleicht die bisher bestehenden regionalen Unterschiede in der Gebietsmeldung aus und lässt eine einfache Einordnung derzeit noch unbekannter, aber ökologisch wertvoller Bestände zu einem späteren Zeitpunkt zu.

Aus fachlicher Sicht ist die Anwendung der nachfolgenden fünf Kriterien geboten (siehe auch Bestimmungen für Phase 2 Anhang III der Richtlinie), die sich an der guten fachlichen Praxis der Gebietsauswahl der bisherigen Bewertungsseminare orientieren:

1. Vorschlagsliste und Gesamtbestand der Lebensraumtypen und Arten

Vorschlagsliste im Sinne der Phase 1 des Anhangs III der FFH-Richtlinie ist die Gesamtheit der Gebiete aus der **FFH-Verbändeliste** und der bisherigen **offiziellen Vorschlagsliste**. Der Gesamtbestand umfasst alle Vorkommen der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II, also auch solche, die nicht in der Vorschlagsliste erfasst sind. Der Gesamtbestand ist die Bezugsgröße für 2), die Kriterien 3) bis 5) werden aus der Kulisse der Vorschlagsliste abgearbeitet.

2. Mindestumfang der Meldung

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der FFH-Richtlinie ist ein ausreichender Anteil des Gesamtbestandes der Arten und Lebensraumtypen im Schutzgebietssystem Natura 2000 zu schützen, um „den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitats der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet (zu) gewährleisten“. Die deutschen NGOs halten dabei den Meldeanteil unserer Nachbarn in der atlantischen Region Deutschlands (Belgien, Niederlande u. Dänemark), die im Durchschnitt Anteile von 60-75% des Gesamtvorkommens der Lebensraumtypen und Arten als pSCI gemeldet haben, für eine geeignete Orientierungsmarke (siehe auch Boillot et al. 1997). Denn immerhin geht es bei den Lebensraumtypen und Arten um Schutzgüter, die entweder sowieso schon gefährdet, europaweit natürlicherweise selten oder in ihrer Verbreitung auf Europa beschränkt sind.

3. Berücksichtigung der besten Flächen

Für den Aufbau des Netzwerkes sind die naturschutzfachlich besten Flächen auszuwählen, damit den Maßgaben der FFH-RL nach einer fachlichen Gebietsauswahl Genüge getan werden kann. Die Meldung der wertvollsten Gebiete ist unverzichtbar und kann nicht durch die Meldung anderer, weniger wertvoller Flächen kompensiert werden. Die Bewertung ist nicht allein anhand der Flächengröße möglich. Vielmehr sind z.B. Vollständigkeit des Arteninventars oder Bestandesalter eines Lebensraumtyps mit zu berücksichtigen.

4. Sicherung der regionalen Vielfalt

Um die regionale Vielfalt an Lebensraumtypen und Arten im Netzwerk Natura 2000 zu sichern, ist eine regionale Streuung der Gebietsvorschläge erforderlich. Als räumlicher Bezugsrahmen werden die naturräumlichen Haupteinheiten (siehe Ssymank et al. 1998) gewählt. Für sie sind jeweils mindestens die 10 besten Flächen für jeden Lebensraumtyp bzw. jede Art als pSCI zu benennen.

5. Sicherung aller Ausprägungen eines Lebensraumtyps

Soweit Variationen eines LRT's oder die standörtliche Vielfalt entlang eines relevanten Gradienten (Kontinentalität, Höhenlage) durch die Meldung der mindestens 10 besten Vorkommen einer naturräumlichen Haupteinheit nicht abgebildet werden, ist die Meldung weiterer Flächen erforderlich, die bisher unterrepräsentierte Variationen beherbergen.

Verfahrensschritte zur Aufstellung einer abschließenden deutschen Gebietsmeldung für die atlantische Region

Aus diesem Kriterienkatalog ergeben sich für die Aufstellung einer abschließenden FFH-Vorschlagsliste folgende Arbeitsschritte:

- Zusammenführung der offiziellen Gebietsvorschläge mit denen der NGOs zu einer gemeinsamen Vorschlagsliste für die weiteren Auswahlsschritte. Insbesondere bei den Arten des Anhangs II erfolgte zusätzlich eine Ergänzung um die Datenbestände des BfN aus dem laufenden F+E-Vorhaben „Wissenschaftliche Grundlagen für die nationale Bewertung der Gebietsvorschläge gemäß FFH-Richtlinie“ (FKZ: 800 82 011).
- Abschätzung des Gesamtbestandes der Lebensräume und Arten und Zuordnung zu den naturräumlichen Haupteinheiten. Bei erheblichen Abweichungen werden begründete Bestandsschätzungen durch die Naturschutzverbände verwendet, die aus allgemein zugänglichen Quellen wie z.B. Biotopkartierungen der Länder oder Fachveröffentlichungen resultieren. Für die Arten liegen entsprechende Werte bisher nicht vor.
- Auswahl **mindestens der bekanntermaßen besten zehn Gebiete, bei unklarer Bewertung** mindestens der zehn größten Gebiete pro Lebensraumtyp des Anhangs I bzw. Art des Anhangs II und naturräumliche Haupteinheit bzw. mindestens so viele weitere, bis der unter 2) genannte Mindestanteil des Gesamtbestandes einer naturräumlichen Haupteinheit erreicht ist. Bei prioritären Arten und Lebensräumen muss der Erfüllungsgrad grundsätzlich im oberen Bereich der Spanne liegen.
- Einzelfallprüfung für die nach diesen Schritten nicht berücksichtigten Gebietsvorschläge, ob kleinere Gebiete mit besonderen Ausprägungen oder besonders hervorragender Qualität eines Lebensraumtyps oder einer Population unberücksichtigt geblieben sind. Diese werden über eine Einzelfallbegründung der Vorschlagsliste zugefügt.
- Ggf. Zusammenfassung benachbarter Teilgebiete zu räumlich sinnvollen Einheiten und Arrondierung der Gebietsabgrenzungen um angeschnittene oder angrenzende Flächen mit Habitattypen des Anhangs I bzw. Lebensräumen der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (siehe Punkt 2 Abs. d der Phase 2 des Anhangs III der FFH-Richtlinie; entfällt in der Regel bei den Verbandsvorschlägen, da dort bereits obligatorischer Arbeitsschritt).
- Rücknahme der fachfremden Kriterien bei der Abgrenzung bisheriger Gebietsvorschläge.

Dieses Verfahren weicht von der unter 2) bis 5) angegebenen Reihenfolge ab. Die Gründe dafür sind rein praktischer Natur. Vergleichbare Angaben über die Qualität der verschiedenen Gebiete liegen nur in Ausnahmefällen vor, sind vermutlich nur in den seltensten Fällen völlig eindeutig und außerdem immer in Kombination mit Größe, regionaler Lage usw. zu sehen. Als einziges nachvollziehbares und vergleichbares Kriterium für eine Bewertung verbleibt letztlich die Flächengröße, **wenn eine klare fachliche Bewertung nicht möglich ist**. In der Praxis dürften mit der Abarbeitung der Arbeitsschritte „mindestens 60 % des Gesamtbestandes“ sowie **„mindestens die bekanntermaßen besten zehn Gebiete, bei unklarer Bewertung** mindestens die größten 10 Gebiete“ oft auch bereits die Gesamtvariation eines Lebensraum-

typs bzw. einer Art abgedeckt sein. Die Einzelfallprüfung dient als Auffanglösung für bekanntermaßen herausragende Gebiete, die über Gebietsgröße und Gesamtbestand dennoch nicht berücksichtigt waren.

Die so zustande gekommene Gebietsauswahl ist nach Einschätzung der deutschen NGOs mit den fachlichen Vorgaben des Artikels 4 Abs. 1 und Anhang 3 der FFH-Richtlinie vereinbar und stellt einen nach derzeitigem Erkenntnisstand geeigneten Grundstock für das kohärente Netz Natura 2000 dar.

Allerdings bleibt auch eine so erstellte Liste für eine Reihe von Schutzgütern (insbesondere sehr seltene oder in Deutschland derzeit verschollene Arten) vorläufig; hier können mit neuen Erkenntnissen in den kommenden Jahren weitere Neuanmeldungen von Gebieten erforderlich werden. Dies gilt auch für häufigere Arten, wenn diese bei genaueren Untersuchungen der nächsten Jahre in bereits geschützten SACs nachgewiesen werden sollten. Sie wären dann zur Verdichtung des Schutzgebietsnetzes als Schutzgüter in den entsprechenden Gebieten nachzumelden.

Nach Abschluss dieser Überarbeitung erfolgte das Ranking der Gebiete in der in Schreiber et al. (2002) beschriebenen Weise. Die Ergebnisse sind in den zwei anhängenden Tabellen dokumentiert. Tabelle 1 listet alle Gebiete auf, die für eine oder mehrere der defizitären Lebensraumtypen des Anhangs I oder Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nachgemeldet werden sollten. Aufgeführt sind aus der FFH-Verbindeliste die Gebietsnummer, der Gebietsname, die Anzahl der Schutzgüter und der beste Rang, den das Gebiet innerhalb der Naturräumlichen Haupteinheit erreicht. Tabelle 2 schlüsselt die Ergebnisse der Kurzübersicht weiter auf: Hier findet sich für jedes Gebiet eine Liste mit den Lebensraumtypen bzw. Arten, deren Häufigkeit, der Rang innerhalb der Naturräumlichen Haupteinheit und verschiedene Angaben zum Schutzgut aus der FFH-Verbindeliste. Für Einzelheiten wird auf die Beschreibung derselben bzw. auf die Anleitung zur BfN-Datenbank für die Erfassung der FFH-Gebietsvorschläge verwiesen, deren Systematik und Struktur die Verbändedatenbank übernommen hat.

Nach wie vor gilt, dass für die allermeisten Gebietsvorschläge aus Schleswig-Holstein nur qualitative Angaben zu Lebensraumtypen vorliegen. Aus dem atlantischen Anteil Sachsen-Anhalts und aus Bremen lagen keine Polygone der offiziellen Gebiete vor, sodass hier ein Abgleich nicht möglich war. Das Gesamtergebnis wird wegen relativ geringen Flächenanteile, die davon betroffen sind, vermutlich nicht wesentlich beeinflusst.

Abb. 1 gibt einen Überblick über die räumliche Verteilung der Gebiete. Grün sind die Gebiete dargestellt, die bereits offiziell gemeldet sind. Rot sind solche, die aufgrund der Defizite und des hier angewandten Auswahlverfahrens als Neuvorschläge nachzumelden sind, während in orangem Farbton Erweiterungsflächen zu bereits offiziell gemeldeten Gebieten dargestellt sind.

Ergebnisse

Aus einer Gesamtheit von ca. 1180 Gebieten, die in der FFH-Verbindeliste für die atlantische Region dokumentiert sind, wurden 824 Gebiete ausgewählt. Sie bilden eine Gesamtkulisse, die nach den Erfahrungen aus den bisherigen wissenschaftlichen Bewertungstreffen für eine ausreichende Meldung ausreichen sollten. Darin enthalten sind die bereits vom Bewertungstreffen in Den Haag akzeptierten

Gebiete. Dies gilt nicht konsequent für die beiden Haupteinheiten D34 und D35 (vor allem Nordrhein-Westfalen), für die wenige einzelne offiziell bereits gemeldete Gebiete existieren, aber nicht in die Verbändeliste übernommen sind. Sie sind lediglich in der Kartendarstellung (Abb. 1) enthalten.

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse für die Länder und für die atlantische Region insgesamt zusammen.

Land	Fläche (km²)	pSCI (ha)	Neue pSCI (n)	Neue pSCI (ha)	Erweiterungen pSCI. (n)	Erweiterungen pSCI. (ha)	Gesamt	Anteil
Niedersachsen	38660	180.913 ha	367	115.952	128	75.440	372.305 ha	9,6
Nordrhein-Westfalen	18.910	77.617 ha	111	33.475	152	92.847	203.939	10,8
Bremen	323	(ca. 1.470)	(17)	4.700	5	(ca. 500)	ca. 5.200	16,1
Hamburg	753	ca. 5.600	-	-	-	-	5.600	7,4
Schleswig-Holstein	8.520	28.384	13	9.550	20	25.259	63.193	7,4
Sachsen-Anhalt	2.385	12.900	?	?	?	?	12.900	5,4
Nur Landfläche	69.551	306.884	Ca. 508	163.677	305	194.046	663.137	9,5
+ 3 sm-Zone	ca. 80.000	986.838		163.677		ca. 330.000 (+ ca. 100.000 AWZ)	1.480.515	18,5

Kurze Bewertung der Ergebnisse

Der Vorschlag der Naturschutzverbände liefert eine Gebietskulisse, die nach aller Erfahrung aus den wissenschaftlichen Bewertungstreffen für die kontinentale und atlantische Region und in einem Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten als ausreichend einzustufen sein dürfte. Mit 9,5 % der Landfläche bewegt sie sich der so geschützte Anteil deutlich unterhalb des europäischen Durchschnitts und etwa in der Größenordnung dessen, was von den Niederlanden von ihrer Landfläche gemeldet haben (hier sind die zur Nachmeldung vorgesehenen Flächen schon mit berücksichtigt).

Für die Landfläche relativiert sich der Wert aus mehreren Gründen weiter:

- Überlappungen mit der kontinentalen Region wurden dann nicht berücksichtigt, wenn sie nur geringfügig waren. Bei einer strengen Wertung lediglich der atlantischen Anteile reduziert sich die Gesamtfläche dadurch geringfügig.
- Die Feststellung der Ergänzungsflächen erfolgte mit Hilfe eines Geografischen Informationssystems automatisch durch Verschneiden der Polygone der offiziellen Meldungen mit denen der Verbändeliste. Dadurch sind neben echtem Ergänzungsbedarf auch solche Flächen enthalten, die als Artefakte ungenauer Digitalisierungen anzusehen sind. Bei konsequenter Tilgung solcher Flächen erfolgt eine weitere geringfügige Reduktion der Gesamtfläche.
- Bei der Festsetzung der Außengrenzen und der Ausgliederung von Teilflächen innerhalb der Gebiete besteht ein Bewertungsspielraum, der sowohl eine Einbeziehung als auch eine Ausgren-

zung zulässt. Insbesondere eine restriktive Handhabung würde ebenfalls zu einer Reduktion der Gesamtfläche führen.

Insgesamt ist also davon auszugehen, dass nach einer Überarbeitung der Verbändevorschläge in der atlantischen Region eine Gebietskulisse von ungefähr 9 % der Landesfläche den deutschen Beitrag für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 stellen würde.

Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Anforderungen nach Phase 2 Anhang 3 FFH-RL

501 der 824 ausgewählten Gebiete beherbergen ein bis fünf prioritäre Schutzgüter, denen die FFH-RL besondere Aufmerksamkeit schenkt.

Der besondere relative Wert des Gebietes auf nationaler Ebene ergibt sich vor allen Dingen daraus, dass für die einzelnen naturräumlichen Haupteinheiten immer die besten Vorkommen ausgewählt wurden, sodass diese Anforderung an das Auswahlverfahren von Anfang an impliziert war.

Eine breite geografische Streuung und gleichmäßige räumliche Verteilung wurde dadurch erreicht, dass für jede naturräumlichen Haupteinheit versucht wurde, eine Mindestanzahl von Gebieten auszuwählen. Das angewandte Auswahlverfahren hat zur Folge, dass es nur in Ausnahmefällen zur Auswahl isolierter und kleiner Gebiete mit wenigen Schutzgütern kommt. Nur 121 von 824 Gebieten beherbergen lediglich ein einziges Schutzgut (14,7 %), wohingegen 372 Gebiete (45 %) fünf bis zu 34 Schutzgüter aufweisen. Bei den Gebieten mit wenigen Schutzgütern handelt es sich dann aber in den meisten Fällen um besonders hochwertige Vorkommen: in 56 Fällen (46 %) ist es eines der 3 besten Vorkommen in seiner naturräumlichen Haupteinheit.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die getroffene Auswahl systematisch im Sinne der Vorgaben der FFH-RL zustande gekommen ist und in hervorragender Weise dazu geeignet ist, die inhaltlichen Anforderungen an das europäische Schutzgebietsnetz zu erfüllen.

Literatur:

- Boillot, F., M.-P. Vignault & J.M. De Benito (1997): Process of assessing national lists of proposed sites of community interest (pSCI) at biogeographical level. *Natur und Landschaft* 72 (11): 474-476
- BUND & NABU (2001): FFH Associations' list of proposed sites for Germany's Atlantic biogeographical region—Summary and Explanation. Unveröff.
- Ellwanger, G., S. Balzer, U. Hauke & A. Ssymank (2000): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbestandsermittlung für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. *Natur und Landschaft* 75 (12): 486-493
- Schreiber, M., M. Gerhard & A. v. Lindeiner (2002): Stand der Umsetzung von Natura 2000 in der atlantischen Region Deutschlands. *Naturschutz und Landschaftsplanung* 34: 357-365
- Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Bonn-Bad Godesberg. Schriftenreihe für Naturschutz und Landschaftspflege, Heft 53

Nr.	Gebietsname	Rang	Schutzgüter
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder Gotteskoog	1	7
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	1	11
1119-921	Ruttebüller See	1	5
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der Böxlunder Geest	2	9
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12 sm-Zone	1	13
1218-920	Bottschlotter See und Umgebung	1	1
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	1	9
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	2	6
1321-920	Pobüller Bauernholz	2	5
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	1	30
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	1	12
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbeker Heide	1	12
1719-921	Untereider zwischen Nordfeld und Tönning	1	3
1720-921	Ostroher Moor	1	1
1818-920	Helgoland-Gebiet	2	9
1820-920	Nordermieleniederung	1	8
1821-920	Riesewohld	1	9
1823-920	Haaler Au-Gebiet	1	3
1923-920	Schierenwald	3	3
1924-920	Naturpark Aukrug	1	13
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	2	14
2022-920	Hochmoore zwischen Kluwe und Vaale	1	2
2026-920	Osterautal	2	11
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	3	6
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	1	17
2122-920	Binnendünengelände Nordoe	1	3
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	3	6
2218-951	Falkenburger Moor	1	3
2218-991	Aßbütteler u. Herrschaftliches Moor	9	4
2220-951	Wingst	2	5
2221-990	Oederquarter Moor	1	3
2222-920	Untereibe zwischen Glückstadt und Hamburg	1	19
2222-950	Wischhafener Süderelbe	2	9
2222-994	Untereibe	1	14
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit Kummerfelder Gehege	1	9
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	1	18
2226-901	Duvenstedter Brook	1	15
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	2	9
2226-920	Oberalsterniederung	2	7
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	1	10
2306-901	Wälder um Hage	1	3
2306-950	Borkum-Riffgrund	1	3
2311-952	Stuhlleide im Dunumer Brook	1	2
2317-950	Weddewardener Außendeich	1	3
2318-950	Knüppelholz	4	10
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	1	13
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	1	5
2319-951	Moorwald Mühedeich	2	3
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	3	6
2320-951	Hackemühlen	7	5
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	1	12
2321-950	Oste (Unterlauf)	1	11
2321-951	Jungclausheide	2	4
2321-952	Himmelpfortener Wald	33	3
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und Pinneberg/Pinnauniederung	1	12
2322-951	Wald bei Groß Sterneberg	1	1
2322-952	Wasserkruger Moor	3	1
2323-950	Elbufer Bützflether Sand	7	2
2324-901	NSG Schnaakenmoor	1	5
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	2	10
2324-921	Tävmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	1	6
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	1	24
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	1	8
2412-950	Eichenwald bei Borgholt	7	1
2413-951	Staatsforst Upjever	2	3
2413-952	Barkeler Busch, Nettkers Busch	1	3
2413-953	Fledermausquartier Rahrdum	2	1
2414-950	Teichfledermausquartier Rüstersiel	1	1
2417-950	Bremerhavener Weserwatt	2	3
2421-950	Behrster Holz	8	1
2421-952	Wälder bei Kaken	12	5
2421-956	Unterlauf der Oste	1	9
2421-990	Hohes Moor	1	5
2422-955	Heidbeck/Stade-Süd	8	4
2422-994	Schwingetal	1	20
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	15	6
2423-952	Alte Wälder Eicheneck und Horst	20	2
2423-990	Feerner Moor	1	5
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	4	9
2424-950	Unterlauf Este	4	8
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	1	5
2428-920	Sachsenwald	7	9
2428-990	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	1	4

2509-994	Großes Meer	1	6
2510-950	Groen Breike	2	2
2510-951	Schlitzdistel-Pfeifengraswiese bei Forlitz-Blaukirchen	3	1
2510-952	Ihlower Forst	1	2
2510-954	Teichfledermaus-Jagdgebiet Ringkanal	1	1
2511-950	Osteregelser Moor	2	5
2511-953	Hooge Brinken	9	1
2513-950	Altwasser Hissenhausen	10	1
2513-951	Altwasser Münsterland	11	1
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	1	5
2513-990	Schwarzes Meer	3	4
2517-950	Vorland der Luneplate	2	2
2517-951	Teichfledermausquartier bei Schwegen	1	1
2517-990	Placken-, Königs- u. Stoteler Moor	7	3
2519-950	Malse	8	6
2519-952	Feuchtwaldkomplex NNW Volkmarst	8	2
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	1	6
2520-951	Barcheler Holz	7	4
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	2	7
2521-950	Tinster Holz / Moore am Pulvermühlenbach	8	4
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	3	6
2521-953	Horner Holz	16	1
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	16	5
2522-956	Hahnenhorst / Wohld	7	4
2522-990	Auetal und Nebentäler	2	10
2522-991	Braken	1	8
2523-950	Büntholz	34	1
2523-952	Kleingewässersystem Apenser Geest	4	1
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	4	5
2524-951	Nincoper Moor	2	2
2525-901	NSG Fischbeker Heide	2	5
2525-994	Buchenwälder in Rosengarten	2	2
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	1	12
2526-903	Die Reit	1	1
2526-904	Kirchwerder Wiesen	2	4
2526-950	Pfarrteiche Meckelfeld	5	2
2526-990	Untere Seeveniederung	1	2
2527-901	Borghorster Elblandschaft	2	12
2527-922	NSG Dalbekschlucht	3	2
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	8	6
2528-950	Teiche N Brandfeldsee	3	1
2529-920	Großer Brook (westl. Lüttau)	3	3
2608-950	Rysumer Nacken	1	7
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	1	13
2608-953	Großer See I (Statoil-Gelände Rysumer Nacken)	1	1
2609-950	Bansmeer	1	1
2609-951	Uphuser Meer	3	1
2609-952	Teichfledermaus-Jagdgebiet Binnenhafen	3	1
2610-994	Fehntjer Tief	1	9
2613-950	Klosterhof Lindern	5	1
2613-951	Klosterhof Jührden	5	2
2613-953	Bockhorner Moor	1	5
2613-990	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	1	4
2614-950	Seghorner Wald	1	1
2614-951	Vareler Wald	4	2
2614-952	Standortübungsplatz Varel-Friedrichsfelde	1	3
2614-994	Neuenburger Holz	1	4
2615-951	Jaderkreuzmoor	2	4
2617-994	Rechter Nebenarm der Weser bei Brake	4	2
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	5	12
2621-951	Meinstedter Moor	7	6
2621-994	Oste mit Nebenbächen	1	23
2622-954	Sellhorner Teiche	6	4
2623-950	Wiegenser Forst	7	6
2623-951	Großes Everstorfer Moor	5	3
2623-954	Thörenwald (Teilbereich)	5	4
2623-955	Ramme	1	3
2624-950	Emsener Weg bei Hollenstedt	7	2
2624-994	Este, Bötersheimer Heide	1	19
2625-955	Teilfläche des Stuvewaldes	12	1
2626-951	Weiher E Marxen	6	1
2626-953	Stembruch W Stelle	9	2
2626-954	Kleines und Großes Brack N Stelle	5	2
2626-956	Ashausener Mühlenbach bei Büllhorn	3	2
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	3	5
2626-958	Pattenserdicke	6	3
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	2	14
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit Ilmenau-Luhe-Niederung	4	7
2627-954	Feuchtgebiete E Laßrönne	5	3
2627-956	Bullteiche E Winsen/Luhe	7	1
2627-958	Brack am Drennhäuser Hinterdeich		1
2627-965	Roddau mit Nebenbächen	1	2
2627-966	Eichenwälder bei Sangenstedt	1	2
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis Tesperhude	1	9
2628-921	NSG Dalbekschlucht	10	4

2628-922	Waldgebiet bei Börnsen	13	3
2628-954	Ordersee NW Bütligen	3	1
2628-956	Griems Kuhle NE Oldershausen	8	2
2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	4	5
2709-950	Süderkolk	8	1
2710-950	Kiessee bei Neermoor	1	3
2710-951	Ems von Emden bis Leer	1	14
2711-950	Leda-Jümme	1	6
2711-952	Terheide	1	1
2711-953	Filsumer Moor	7	3
2711-954	Holtlander Ehe	3	1
2714-950	Ammerländer Büsche	1	4
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	1	6
2716-958	Biotop Watkenstraße	1	3
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	2	12
2717-952	Neuenkirchener Heide	6	6
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	2	8
2718-950	Schönebecker Aue	2	8
2718-951	Oldenbütteler Holz	15	6
2718-994	Reitbruch	1	6
2719-950	Günнемoor	1	5
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor	1	16
2720-951	NSG "Hinter dem Wieh Brock"	9	3
2720-952	Hepstedter Büsche	4	2
2720-953	Wald W Wennebostel	20	2
2720-955	Hudewald "In den Meddeln"	10	3
2721-954	Borstgrasrasen WSW Badenstedt	5	4
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	1	6
2723-954	Eichenwald w Kalbe (BAB Raststelle Sittensen)	14	2
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	2	5
2724-951	Glüsinger Bruch / Osterbruch / Knick	1	2
2724-952	Kauers Wittmoor	2	6
2725-951	Büsenbachtal	9	3
2725-990	Lüneburger Heide	1	22
2726-955	Teiche SW Toppenstedt	7	1
2726-959	Garlstorfer Wald	1	2
2727-950	Wald bei Luhmühlen	8	3
2727-955	Hambornsborg/Gellerser Anfang	3	1
2728-950	Luhe-Oberlauf	3	1
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	2	6
2810-951	Pfeifengraswiese Breinermoor	3	1
2810-952	Kleingewässer bei Weekeborg	2	2
2810-953	Völlenerkönigsfehrer Moor	3	3
2811-950	Langholter Meer	1	4
2811-951	Wald bei Potshausen	10	1
2811-952	Leda-Altarm Nehse	4	2
2811-953	Leda-Altarm Groene Barg	5	2
2811-954	Leda-Altarm Warmse (Ubbehausen)	6	2
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	1	13
2812-953	Drakamp-Schlatt	2	1
2812-954	NSG Barge einschl. Badensee	1	1
2813-951	Holtkamp	3	3
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	1	10
2816-951	Holler- und Wittemoor	3	4
2816-952	Quellmoor	3	2
2817-950	Werderland	4	2
2817-953	Lesum	1	6
2817-954	Ochtumer Sand	2	7
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	3	7
2818-950	St. Jürgensland	1	3
2818-952	Dunger See	2	1
2818-953	Grambker Feldmarksee	3	1
2818-955	Niedervieland	5	2
2818-956	Blockland	6	4
2818-957	Eremit-Vorkommen Sankt Magnus	1	1
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	1	6
2819-951	Farger Heide und Heideweiher	1	4
2819-952	Eremit-Vorkommen Lehe	2	1
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	1	29
2820-952	Lehmkuhle Otterstedt	9	2
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	1	15
2822-951	Luhner Holz (Weichel) und Stellmoor mit Teich	3	3
2823-951	Veerse	2	9
2823-955	Fintau und Ruschwede	3	8
2826-950	Feuchtgebiet E Evendorf	10	1
2826-953	Luhe	2	3
2827-950	Lopau	3	5
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	1	23
2830-950	Neetzeniederung südlich Dahlenburg	5	3
2830-951	NSG Kleine Göhrde	10	3
2830-990	Breiser Grund (Göhrde)	1	5
2831-950	Mosebusch bei Dragahn	4	2
2910-990	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	3	4
2911-950	Brunselmeer	4	6
2911-951	Esterweger Dose	2	6

2914-950	Lethetal	1	7
2915-950	NSG "Osenberge"	3	2
2916-950	Staatsforst Stühe	4	6
2916-990	Hasbruch	1	7
2917-950	Stemmer Holz	7	2
2918-950	Kladdinger Wiesen	3	5
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	1	10
2918-952	Eremit-Vorkommen Bürgerpark Findorf	3	1
2919-953	Eremit-Vorkommen Oberneuland	4	1
2920-950	Ottersberger Moor	6	7
2920-954	Pracher Moor mit Teichen	15	1
2921-950	Waller Moor	14	7
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	5	8
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	8	7
2921-953	NSG Wolfsgrund	10	4
2921-954	Fuchsberg	14	1
2921-955	Im Hegeholz W Eversen	18	1
2921-956	Ahausener Bach (Mühlenteich bis Mündung)	11	4
2921-957	Borstgrasrasen und Postmoor bei Posthausen	3	4
2921-958	Spanger Holz	7	1
2922-950	Wedeholz	1	1
2922-951	Rodau und Hasselbach	4	8
2922-952	Wiedau und Trochelbach	1	13
2923-951	Niederung w Rosebruch	2	5
2924-950	Stichter See	3	4
2924-951	Höpen	5	2
2924-952	Großes Moor	4	6
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	1	6
2928-950	Schwiebau mit Arendorfer Moor	1	8
2929-950	Ilmenau mit Nebenbächen (Ergänzung)	2	1
2929-953	Mührgehege bei Oetzendorf	1	2
2929-990	Lohn	1	2
2931-950	Hoher Mechtin bei Gülden	5	2
3010-950	Dortmund-Ems-Seitenkanal	1	4
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	1	17
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	10	5
3016-950	Wehe	13	4
3016-951	Dötlinger Holz	5	3
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	1	29
3017-952	Standortübungsplatz N Harpstedt	8	2
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	1	8
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	1	10
3018-951	Leerßer Schlatt	4	2
3019-950	Waldgebiet bei Gut Falkenburg	19	3
3019-994	Amphibienbiotop Friedeholz Schlatt	5	1
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	1	15
3021-954	Kirchturm Kirchlinteln	2	1
3021-955	Lindhoop	11	1
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	1	5
3022-951	Moortümpel Sehlinger Heide	3	4
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	2	6
3022-955	Großes Holz	4	1
3022-956	Eitzenbruch	23	1
3022-957	Sahlingsloher Forst	19	2
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	5	10
3023-990	Grundloses Moor	2	4
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd	1	13
3030-950	Berghofwald	1	2
3030-952	Droher Holz	4	2
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	1	9
3113-950	Hövel	9	1
3114-950	Cappelner Bruch	8	3
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	1	9
3117-950	Wälder im Dünsener Bachtal	8	4
3118-954	Lindschlag	17	2
3118-955	Ebersheider Wald	19	2
3118-956	Gattau	15	3
3119-950	Syker Hache-Tal	3	4
3119-951	Borsteler Wald	15	3
3119-952	Marschbruch	11	3
3119-953	Vilsa-Wald	16	3
3120-950	Hägerdorn	26	2
3121-950	Höpen	7	5
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	3	14
3121-952	Stedebergen	3	1
3122-951	Tonkuhlen bei Armsen	1	3
3122-990	Vehmsmoor	3	2
3124-952	Witte Moor	4	4
3124-994	Böhme	1	22
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd	1	17
3125-990	Großes Moor bei Becklingen	2	3
3126-950	Hermannsbürger Gehege	1	9
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	1	22
3127-950	Unterlüß	2	5
3127-951	Oberohe/Niederohhe	2	7

3128-950	Hardautal mit Räberspring	4	12
3129-950	Wierener Berge	2	5
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	2	8
3129-952	Feuchtwälder bei Kallenbrock	3	3
3129-990	Bullenkuhle	4	4
3130-951	Luronium-Teich bei Bockholt	1	2
3209-994	Ems	1	33
3210-950	Dörgener Moor	5	4
3214-950	Tenstedter Bruch	2	3
3214-951	Harmer Holz	3	4
3215-950	Waldbereiche um Gut Vardel	19	4
3216-951	Freesenholz und Herrenholz	2	5
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	1	10
3218-994	Klosterbachtal	4	6
3220-950	Ortschaft Brücken	1	1
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	5	7
3221-951	Ortschaft Eystrup	3	1
3221-952	Teiche Gandesbergen	8	3
3223-950	Fledermausquartier Ahlden	2	1
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	1	34
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	1	19
3226-950	Wildeck	1	6
3226-990	Bornriethmoor	2	5
3227-950	Bohlenbruch	1	2
3227-951	Aschauteiche	2	11
3227-990	Breites Moor	3	4
3228-950	Großer Kain	8	1
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	4	5
3306-950	Denne u. Umgebung	23	5
3306-952	Vechte-Altarm Volzel	6	2
3306-954	Coevorden-Piccardie-Kanal	4	2
3308-951	Georgsdorfer Moor	1	5
3310-994	Untere Haseniederung	1	19
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	1	13
3313-950	Hase - Wrau	4	2
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	2	6
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	1	7
3315-951	Aschener/Heeder Moor	4	7
3316-950	Boller Moor und Lange Lohe	8	3
3319-950	Sulinger Moor	4	9
3319-952	Siedener Moor	5	10
3320-951	Oyler Berg	1	5
3320-953	Ortschaft Binnen	2	1
3321-950	Hohe Horst / Sündern	1	5
3321-951	Schwarzes Moor	4	8
3321-952	Düsterer See	11	3
3321-954	Nienburger Bruch	3	5
3322-950	Lichtenmoor	2	9
3323-950	Suderbruch	20	2
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	4	19
3326-950	Entenfang Boye	2	3
3327-950	Am Aschenberg	1	7
3328-950	Hegmoor	7	4
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	2	10
3329-950	Bruno	7	3
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	2	7
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	3	14
3406-954	Großer Zwannenberg	3	4
3407-951	Fettpott und Umgebung	4	4
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	7	6
3409-950	Krähenbeerendüne Wachendorf	5	2
3411-951	Pottebruch	7	4
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	2	6
3412-952	Maiburg, Dorfwiesen Bippen	1	4
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	6	5
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	5	7
3412-955	Dalumer Holz	2	7
3413-950	Heidemoore bei Druchhorn	6	4
3413-954	Reservebecken Alfsee	4	4
3414-950	Artlandbäche-Südost	3	4
3414-952	Dammer Berge	1	9
3415-951	Dümmer	1	8
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in Diepholzer Moorniederun	2	8
3416-991	Oppenweher Moor	2	6
3417-950	Rehdener Geestmoor	2	10
3417-994	Neustädter Moor	1	9
3418-950	Bleckriede	6	1
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	4	11
3420-950	Altarme Dunk	10	5
3421-990	Rehbürger Moor	1	5
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	2	7
3425-950	Walbeck	1	5
3425-990	Trunnenmoor	1	5
3426-950	Wathlinger Forst	3	3
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	4	5

3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	1	11
3429-951	Ise und Nebengewässer	2	5
3429-953	Truppenübungsplatz Wesendorf	1	1
3430-950	Beverbach	3	9
3430-994	Vogelmoor	1	6
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	1	12
3431-951	Kiebitzmoor	16	1
3506-950	Wolsterbachtal	5	2
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	5	5
3507-952	Overeschhoek/Nordbecks Mühle	12	3
3507-953	Grünland NE Getelo	7	3
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	6	14
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	15	6
3508-953	Vechte-Altarme Hesepe	13	2
3510-950	Wald bei Messingen	11	2
3511-900	Bachniederungen mit Anteilen von Moor - und Waldflächen, Binnendü	5	3
3513-950	Thiener Mühlenbach	10	7
3513-951	Gehn	1	14
3514-950	Nonnenbach / Ellhornbach	10	4
3514-953	Hohe Hase	7	3
3514-954	Darnsee	1	3
3514-955	Wittefeld	1	8
3514-956	Randbereiche des Großen Moores	7	4
3514-957	Eichenreihen am Vördener Damm	4	2
3516-900	Buchenwaldausprägungen Steweder Berg, Kollwesshöf	2	2
3516-901	Tiefenriede bei Döhne	1	2
3516-950	Steweder Berge	1	3
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinterrfeld	5	6
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit Erweiterungsfläche	2	5
3518-900	Eichen-und(Hain)Buchenwälder, Wickriede Osterwald	3	4
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner Marsch,Schmiede	6	7
3520-901	Abschnitt der Gehle mit östlich angrenzenden Eichen-Hainbuchenwä	9	4
3520-950	Ortschaft Diethe	1	1
3520-951	Fuldetal/Sündern	3	6
3521-950	Wildes Moor	9	3
3521-951	Fulde	6	3
3521-952	Rehburger Berge	8	4
3521-953	Wald bei Poll	11	2
3521-954	Wölpinghauser Berg	3	5
3521-955	Salzstelle nördlich Wiedenbrügge	2	1
3521-958	Düdinghärser Berg	2	1
3521-959	Hagenburger Holz	1	3
3521-994	Steinhuder Meer	1	14
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	1	5
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	1	13
3522-952	Hellern/Wieckenberg	6	7
3524-950	Wiesenbachtal b. Isernhagen	1	4
3524-951	Wälder im Umfeld der Auter	8	2
3525-950	Kugelfangtrift und Standortübungsplatz Nord	3	4
3525-951	Oldhorster Moor	7	3
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	1	13
3525-953	Erweiterung Bockmerholz	5	3
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	7	5
3526-951	Schilfbruch	10	7
3527-994	Amphibienbiotop nördl. Plockhorst	9	1
3528-950	Schweineholz	1	2
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	2	9
3529-951	Tankumsee	1	1
3530-950	Rabenberg bei Wolfsburg	7	4
3530-951	Allersee	2	1
3531-994	Drömling	1	17
3608-951	Rolinks Tannen	12	2
3608-952	Syen Venn	3	9
3608-954	Bentheimer Wald	1	8
3609-950	Bentheimer Berg	38	5
3609-954	Samerrott	2	3
3609-990	Berger Keienvenn	2	3
3609-991	Ahlder Pool	2	5
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete Dünenkomplexe bei Rheine	1	22
3610-994	Gutswald Stovern	3	3
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	2	17
3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	3	5
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	3	7
3615-954	Fellage	12	3
3616-901	Auenbereiche des Großen Dickfußes, Waldparzelle Levern	6	3
3618-900	Von Bachläufen durchzogene Eichenwälder im Mindenerwald	1	4
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	2	6
3620-900	Wälder mit westl. angrenzendem Gehle-Bachabschnitt Stehbrink	4	4
3620-950	Hiddensener Wäldchen	5	3
3620-953	Schaumburger Wald	1	5
3621-950	Stadthagen	1	1
3621-951	Beckedorfer Kirche	2	1
3621-952	Ottenser Wald	1	2
3621-953	Hülse	2	1
3621-954	Flothbach	6	1

3621-955	Vornhäger Bach	1	2
3621-958	Brand bei Niengraben	2	2
3622-950	Haster Wald	1	1
3622-952	Rodenberger Aue	2	2
3622-953	Munzeler Mark	1	2
3622-954	Haster Holz	3	4
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	1	7
3623-952	Flakenbruch	4	3
3623-954	Binnensalzstelle Empelde	1	1
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	2	5
3624-951	Alte Leine	1	5
3624-952	Jeinser Holz	5	3
3624-953	Eilenriede Süd	13	4
3624-954	Eilenriede	1	2
3625-950	Flakenbruch bei Lehrte	9	3
3625-951	Mergelgrube Teutonia Süd	2	3
3625-953	Mergelgrube HPC I	2	4
3625-994	Bockmerholz, Gaim	1	8
3626-950	Hainwald bei Hämelerwald	18	1
3626-990	Hahnenkamp	1	3
3627-950	Schwarzwasser-Niederung	5	1
3627-952	Meerdorfer Holz	4	3
3627-953	Fuhse-Niederung	7	5
3627-954	Woltorfer Holz	2	2
3629-950	Sundern	12	2
3629-951	Dibbesdorfer Holz	8	1
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg	2	8
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	1	7
3630-951	Mittlere Schunter	6	10
3631-950	Steinbrink bei Rickensdorf	22	2
3708-900	Rüenberger Venn/Ammerter Mark u. Strönhof	1	14
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	2	6
3708-950	Weiher Sieringhoek/Golfplatz	10	3
3708-951	Gerlachsche Fläche	3	3
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	1	14
3708-953	Tüschbrook	37	2
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden bzw.Borstgrasrasen	3	9
3709-901	Offlumer Binnendünen	11	4
3709-902	Naturnaher Bachabschnitt der Steinfurter Aa	1	3
3709-903	Salzbrunnen am Rothenberg	2	1
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	5	8
3724-950	Stamstorfer Holz	3	5
3724-952	Harsumer Holz, Borsumer Holz	4	1
3727-950	Klein Lafferder Holz	8	1
3727-951	Lengeder Teiche	1	2
3727-952	Wälder bei Bettmar	2	4
3728-950	Denstorfer Holz	5	2
3728-951	Gleidlinger Holz	1	2
3728-952	Sonnenburger Holz	7	2
3728-953	Geitelder Holz	4	2
3729-950	Herzogsberge bei Cremlingen	4	1
3729-951	Mascheroder, Rautheimer, Nieder- u. Oberdahlumer Holz	4	1
3729-952	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	3	4
3729-954	Großes Holz und Veltheimer Forst bei Cremlingen	2	3
3729-955	Salzstelle bei Salzdahlum	2	1
3730-950	Weddeler Wohld	5	2
3730-951	Roter Berg und Umgebung	1	7
3730-952	Elm mit Pufferzonen	1	15
3730-953	Salzstelle bei Beienrode	3	2
3730-990	Rieseberg	6	4
3731-950	Dorm	1	6
3732-951	Lappwald	1	14
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer Venn bis Amtsvon)	1	12
3807-900	Butenfeld	4	5
3807-901	Waldgebiete bei Wessum	20	1
3807-902	Ahauser Aa	9	5
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	2	6
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und Seitenbach	4	11
3809-902	Herrnholz und Schoeppinger Berg	5	1
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und Übergangsflächen,Eichenw	2	10
3810-901	Bagno	2	7
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen Abschnitten	3	9
3811-901	Hanfteich	6	4
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei Ladbergen	3	9
3812-901	(Feucht)Grünland im Kattenvenn und Waldkomplex im Kattmannskamp	17	3
3824-950	Hallerburger Holz	6	2
3827-951	Berelries	3	2
3828-950	Beddinger Holz	1	1
3829-950	Geltwiese/Meltenwiese	3	3
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	1	10
3829-952	Oderwald	2	5
3830-951	Magerrasen Mühlenberg u. "Rottebeek"	2	3
3830-952	Lah, Küblinger Trift und angrenzende Landschaftsteil	1	3
3830-953	Wasservogelreservat Schöppenstedter Teiche	3	2
3906-900	Berkel	5	8

3906-902	Crosegewicker Feld und Crosegewicker Grenzwald	8	5
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker Venn/Ellewicker	3	8
3906-904	Fürstenbusch	7	4
3907-902	Schwattet Gatt	8	7
3909-901	Wald bei Haus Burlo	21	3
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	6	6
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter Berge und Boltenmoor	2	13
3911-903	Hanseller Floth	1	2
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz Handorf	4	8
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser Wald, Barrelpau	1	12
3915-902	Feuchtgebiet Vennheide mit Sandforthor Bach im Osten	30	4
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet Patthorst, Sandtrockenra	7	8
3929-950	Kiesteich Isingerode	3	1
3929-951	Okertal	1	7
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	1	5
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	1	8
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	1	9
4008-901	Gaupeler Mark	1	3
4009-900	Empter Mark	32	6
4009-901	Baumberge	1	3
4009-902	Roruper Holz mit Kestenbusch	7	3
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher Laubwald-komplex,	3	8
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker Tiergartens und der Angel	4	9
4013-900	Heidbusch	28	2
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw. Telgte u. Warendorf	2	11
4013-902	Averbergsche Teiche und Laubwälder	34	1
4013-903	Wald östlich Freckenhorst	2	1
4013-904	Wartenhorster Sundern südöstlich von Everswinkel	22	1
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	1	15
4014-901	Landratsbüsche	3	1
4014-902	Sassenberger Brook - Tiergarten	18	4
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und Heiden Hovesaat	10	6
4016-900	Lutter, Greipen-,Trüggel-,Reiherbach, Rieselfelder Windelsbleiche	21	7
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,Lichte-,Steinbach Brock	6	7
4017-900	Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche	10	4
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter Wald	3	8
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht		
(Ergänzungsfl. zu L		4	11
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	1	31
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach, Hövelhofer Wald	1	14
4101-902	Wylter Meer	8	1
4102-900	Eltener Berg	16	1
4102-901	Halbinsel Salmorth	3	5
4102-902	Die Moitjes	13	2
4102-904	Rhein	1	8
4103-900	Gewässersystem Grietherorter und Bienener Altrhein - Millinger Me	1	4
4103-901	Dornicker Ward	17	4
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt, Kalflack	1	6
4103-903	Emmericher Ward	10	5
4103-904	Die Hetter	1	4
4104-900	Bocholter Aa/Suderwicker Venn	12	4
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und Isselburg-Werth	1	5
4105-902	Hohenhorster Berge	10	2
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes Venn/Borkenberge/Halterner Seen	1	20
4109-900	Wildpark Dülmen	6	2
4110-900	Bulderner Feldmark	41	3
4111-900	Venner Moor	7	4
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	1	9
4112-901	Waldgebiet Brock	26	1
4113-900	Kettelerhorst mit Voßbach	12	1
4113-902	Sundern-Tönnishäuschen incl. Hellbachaue N Vorhelm	14	2
4113-903	Torcksholz E Vorhelm	39	1
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	5	7
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	5	7
4114-903	Wälder und Weiher am Pilatusberg	23	2
4115-900	Ruthenbach, alte (Hain)Buchenwälder Putz, Fuchsbruch	34	3
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	8	7
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-StrukturenWapel-/Ölbach	11	6
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen, Rengerwiesen / Haustenbach	8	8
4128-950	Harly	2	13
4201-900	Reichswald	2	4
4202-901	Kranenburger Bruch	7	4
4203-900	Wisseler Dünen	3	2
4203-901	Wald zwischen Schneppenbaum u. Moyland	4	4
4204-900	Wittenhorster Heide	43	3
4204-901	Gewässersystem Hagener Meer - Haffensche Landwehr - Reeser Altrhe	9	2
4204-902	Kolke und Woyen bei Haffen-Mehr	16	3
4204-904	NSG Gut Grind	27	1
4205-900	Dingdener Heide	5	5
4205-901	Diersfordter Forst	1	10
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	6	9
4207-901	Kranenmeer	7	3
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	9	6
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	4	6
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch, Kippheide	8	9

4208-902	Wald, Quellbach, Grünland Schultendille		
Hohe Mark 29		4	
4209-900	Stever	1	4
4210-900	Sandforter Forst	3	5
4211-900	Wälder bei Nordkirchen	13	2
4212-900	Wald und Grünland bei Heessen	1	4
4213-900	Uentropen Wald	8	3
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am Vinkewald	1	7
4214-900	Havixbrock	4	2
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	3	7
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	2	6
4214-903	Önkhaus Berg	26	3
4215-900	Buchenwaldausprägungen mit westlich angrenzendem Forthbach Langen	10	4
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	1	8
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems Heder, Gunne	1	11
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	10	6
4218-902	Tallwiesen	3	3
4218-904	Tongrube Alte Schanze	1	1
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	18	7
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	5	6
4304-900	Hochwald und Tüschental	5	3
4304-901	Bislicher Insel	2	4
4304-902	Die Hees	11	1
4304-903	Grossenbusch/Bollendonks Ley	13	4
4305-900	Untere Lippeaue	1	16
4305-901	Schwarzes Wasser	1	5
4305-902	Droste Woy	2	3
4305-903	Weseler Aue	1	3
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und Postwegmoore	1	15
4306-901	Kaninchenberge	8	4
4306-902	Testerberge	2	5
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	1	13
4307-901	Gartropen Mühlenbach	9	5
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem Silvertbach Sinsen	16	7
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	23	5
4311-900	Cappenberger Wald	2	5
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	2	15
4312-902	Sandbochumer Heide	29	3
4313-900	Geithe	2	3
4313-903	Kuhholz	16	4
4314-901	Quabbeaue	5	4
4314-902	Bröggel	19	1
4314-904	Ahsewiesen	12	3
4314-905	Alpke	23	2
4314-906	Rosenau	0	4
4315-900	Woeste	1	4
4315-902	Brockbusch	21	3
4315-903	Gieselersystem und Pöppelschetal	3	10
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	2	9
4316-901	Steinbruch an der Berger Straße	8	2
4316-902	Westerschledde	2	4
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Samtholz, Habringhauser Mark	3	7
4317-902	Prövenholz	11	1
4317-903	Steinbrüche "Auf der Höhe"	2	1
4403-900	Haagscher Wald Geldern	29	2
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekeendonk	1	15
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	19	6
4404-900	Die Leucht	3	4
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland Gottlieber Wardt	1	5
4406-900	Krummbeck-Scholtenbusch	7	4
4406-901	Rheinaue Walsum	1	5
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und Oestrichtal	4	6
4409-904	Langeloh-Tal	25	4
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	22	5
4410-902	NSG Mengeder Heide	39	1
4410-903	Bodelschwingher Wald W Schloß Bodelschwingh	36	3
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	12	5
4410-908	NSG Hallerey	4	2
4410-909	Holthausen Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem Brink"	3	5
4411-900	NSG Lanstropen See	8	1
4411-901	Kurler Busch, Wickeder Holz, Buschei, NSG Alte Körne u. Ramsloher	9	3
4412-900	Wald- und Grünlandgebiete bei Bönen	15	3
4412-901	Mühlhausener Mark und Uelzener Heide	6	4
4413-900	Wälder NW Oberense	33	1
4414-900	Blögge	13	4
4414-902	Salzbrink	3	3
4415-900	Buchenwälder um Mellrich	10	3
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	26	8
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	2	5
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	8	7
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	13	6
4504-901	Waldkomplex Wachtendonk	26	3
4505-900	Reyener Berg und Vluybusch	19	2
4507-901	Ripshorster Wiesen	24	1
4510-908	Rombergpark, Rombergwiese, Tiergarten und Talgrund Schondelle	18	2

4510-910	Niederhofer Holz, Rombergholz, Großholthausen Mark mit Siepentäle	1	4
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	1	24
4604-900	Niersaue	1	8
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG Tote Rahm	3	6
4605-901	Niepkühlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper Altrheinrinne, NSG Ni	6	5
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	2	5
4605-903	NSG Latumer Bruch	1	5
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	4	6
4606-902	Überanger Mark und Forstbusch	2	2
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	1	8
4705-900	Strümper Busch und NSG Der Meerbusch	6	4
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	1	5
4706-901	NSG Ölgangsinsel und S anschließende Kleingehölze	29	2
4802-900	Heideflächen im Effelder Wald	15	2
4803-901	Helpensteiner Bachtal, Rothenbachtal	13	9
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	1	12
4805-900	Erftaue N Grevenbroich	17	4
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	3	5
4807-900	NSG Further Moor	12	3
4807-901	NSG Spörkelnbruch und Teil des Hildener Stadtwaldes	3	3
4807-902	NSG Ohligser Heide	4	6
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und angrenzende	2	9
4807-904	Teilfläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom Hildener Stadtr	7	5
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer Grenze	1	11
4902-901	Wurmaue zwischen Geilenkirchen und Kempen (Mündung in die Rur)	8	4
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbusch	2	7
4907-900	NSG Worringer Bruch	2	6
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	3	6
4907-903	NSG Rheinaue Langel-Merkenich und NSG Flittarder Aue	15	3
4908-901	Wupperrau und -hänge mit Hülscheider Bachtal bei Bergisch-Neukirch	4	7
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschraht	1	11
5002-900	Rimbunger Busch und Kanualbusch	5	1
5002-901	NSG Teverener Heide	1	6
5004-900	Wald an der KFA Jülich und NSG Langenbroich-Stetternicher Wald	7	2
5004-901	Lindenberger Wald	22	1
5006-901	Koenigsdorfer Wald	1	4
5007-900	Nüssenberger Busch	10	2
5008-900	Dellbrücker Heide	12	2
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	5	8
5008-903	Königsforst	1	10
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmtal	2	10
5102-904	NSG Mittleres Broicherbachtal und NSG Quellgebiet Broicher Bach	39	3
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	2	9
5105-900	Reste des Hambacher Forstes S der A4	1	1
5105-901	Steinheide	14	1
5105-902	Nörvenicher Wald mit alter Burg	17	1
5105-903	Dickbusch	11	3
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener Bruch	6	5
5107-902	Ville	3	8
5107-903	NSG Wald-Seen Bereich Theresia	5	1
5107-904	Heider Bergsee und Schluchtsee in der Ville-Seenkette	3	1
5107-905	Ober-, Mittel- und Untersee in der Ville-Seenkette	4	1
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	2	20
5109-901	Stallberger Teiche	10	4
5204-906	Gürzenicher Bruch und Wälder am Fischbach	6	2
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	1	9
5205-901	Neffelbachaue bei Zülpich	8	4
5206-900	Brachflächen am Villehang bei Bliesheim	5	2
5206-901	Friesheimer Busch	11	3
5207-900	Kottenforst	1	9
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung in den Rhein	2	12
5209-902	Tongrube bei Niederpleis	12	1
5305-901	Ginnicker Bruch	2	2

Erläuterungen der Spalten: Spalte 1 enthält die Gebietsnummer der Datenbank, Spalte 2 den Namen. In der dritten Spalte ist der beste Rang eingetragen, den das Gebiet für ein Schutzgut in seiner Naturräumlichen Haupteinheit erreicht, während Spalte 4 die Anzahl der FFH-Schutzgüter des Gebietes nennt.

NR	Gebietsname	Name des Schutzgutes	EU-Nr	Rang	Anzahl	Jahr	Zst	NHE	BL	Quelle	Jahr
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Alosa fallax	1103	1				D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Coregonus oxyrhynchus	1113	1				D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	1			D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Lutra lutra	1355	1				D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Misgurnus fossilis	1145	1				D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	1			D21	SH	eigene Erhebungen	
1118-921	Gewässer und Feuchtgebiete Wiedingharder	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1			D21	SH	eigene Erhebungen	
1119-921	Ruttebüller See	Alosa alosa	1102	1				D21	SH	LANU	1999
1119-921	Ruttebüller See	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	40	1998	B	D21	SH	LANU	1999
1119-921	Ruttebüller See	Coregonus oxyrhynchus	1113	2				D21	SH	LANU	1999
1119-921	Ruttebüller See	Lutra lutra	1355	2				D21	SH	eigene Erhebungen	
1119-921	Ruttebüller See	Misgurnus fossilis	1145	2				D21	SH	LANU	1999
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Coregonus lavaretus oxyrhinchus	1113	1				D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Lampetra fluviatilis	1099	1				D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Petromyzon marinus	1095	1				D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Alosa fallax	1103	2				D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Alosa alosa	1102	2				D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Ästuarien	1130	3	1			D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Riffe	1170		1			D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung	1110		1			D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Phocoena phocoena	1351			1996		D21	SH	Adelung, D., H. Heidemann, K.	1997
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Flache große Meeressarme und -buchten	1160		1			D21	SH	eigene Erhebungen	
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Halichoerus grypus	1364		100	1998		D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Tursiops truncatus	1349					D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1215-920	Flachmeer westlich des Wattenmeeres bis zur 12	Phoca vitulina	1365					D21	SH	Stock, M., E. Schrey, A.	1996
1218-920	Bottschlotter See und Umgebung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	1	1993		D21	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Ästuarien	1130	1	15000	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Primärdünen	2110	1	15	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Mehrfährige Vegetation der Kiesstrände	1220	1	50	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)	1150	1	10	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion	2170	1	1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten	1230	1	1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	1	7430	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Petromyzon marinus	1095	2				D21	SH	Stock, M. et al.	1996
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Lampetra fluviatilis	1099	2				D21	SH	Stock, M. et al.	1996
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Alosa fallax	1103	3				D21	SH	Stock, M. et al.	1996
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Alosa alosa	1102	3		1999		D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Phocoena phocoena	1351		6000	1998		D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria	2120		35	1996		D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt	1140		123500	1996	A	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Tursiops truncatus	1349			1994		D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Trockene europäische Heiden	4030		1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Riffe	1170		1	1996	C	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung	1110		9500	1996	A	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Pioniervvegetation mit Salicornia und anderen	1310		1300	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Halichoerus grypus	1364		4000			D21	SH	Stock, M. et al.	1996
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae)	1320		700	1996	B	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Flache große Meeressarme und -buchten	1160		128000	1996	A	D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Feuchte Dünentäler	2190		1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation	2130		1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum	2140		1			D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Einjährige Spülsäume	1210		20	1996	B	D21	SH	LANU	1999

1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und	2180		1		D21	SH	LANU	1999
1519-920	Schleswig-Holsteinische Nordseeküste	Phoca vitulina	1365		5000	1999	D21	SH	LANU	1999
1719-921	Untereider zwischen Nordfeld und Tönning	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	7	1988 A	D21	SH	LANU	1999
1719-921	Untereider zwischen Nordfeld und Tönning	Ästuarien	1130	2	2760	1999 C	D21	SH	LANU	1999
1719-921	Untereider zwischen Nordfeld und Tönning	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	2	75	1999 C	D21	SH	LANU	1999
1720-921	Ostroher Moor	Graphoderus bilineatus	1082	1		1999	D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten	1230	2	1		D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Mehrfährige Vegetation der Kiesstrände	1220	2	1		D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Alosa alosa	1102	4			D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Phoca vitulina	1365				D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Phocoena phocoena	1351				D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Halichoerus grypus	1364				D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Einjährige Spülsäume	1210		1		D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Acipenser sturio	1101				D21	SH	eigene Erhebungen	
1818-920	Helgoland-Gebiet	Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung	1110		1		D21	SH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Primärdünen	2110	2	1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Petromyzon marinus	1095	3		A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	3	1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Lampetra fluviatilis	1099	3		A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Alosa fallax	1103	4		A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Flache große Meeressarme und -buchten	1160		3	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria	2120		1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt	1140		11349	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae)	1320		1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Pioniervegetation mit Salicornia und anderen	1310		1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Phocoena phocoena	1351			A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation	2130		1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Einjährige Spülsäume	1210		1	A	D21	HH	eigene Erhebungen	
2016-901	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Phoca vitulina	1365			A	D21	HH	eigene Erhebungen	
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	185	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	155	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	10	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	170	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	130	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	55	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	4	55	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	5	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	8	10	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	5	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1119-920	Süderlügumer Binnendünen	Trockene europäische Heiden	4030		20	1998 B	D22	SH	Landesamt für Naturschutz und	1993
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Leucorrhinia pectoralis	1042	2			D22	SH	LANU	1999
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Lampetra fluviatilis	1099	4		1998	D22	SH	Ministerium für ländl. Räume,	1998
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	150	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	7	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	75	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Lampetra planeri	1096	5		1998	D22	SH	Ministerium für ländl. Räume,	1998
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		5	1999 A	D22	SH	LANU	1999
1121-920	Jardelunder Moor und Wallsbek; Eichenwälder der	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	10	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	3	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	2	75	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	64	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	10	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	5	23	1998 C	D22	SH	LANU	1999

1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	30	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	10	3	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1319-920	Lütjenholmer und Bargumer Heide	Trockene europäische Heiden	4030		50	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	141	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	7	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	11	3	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		11	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1320-920	Wacholderheiden der Bredstedt-Husumer-Geest	Trockene europäische Heiden	4030		15	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1321-920	Pobüller Bauernholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	40	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1321-920	Pobüller Bauernholz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	6	40	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1321-920	Pobüller Bauernholz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	38	1999 C	D22	SH	LANU	1999
1321-920	Pobüller Bauernholz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	27	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1321-920	Pobüller Bauernholz	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		5	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	369	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	85	1981 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	2395	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	205	1996 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	255	1996 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	30	1996 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	7	20	1999 A	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Lebende Hochmoore	7110		40	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1621-920	Eider-Treene-Sorge-Niederung und Geestholme	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		20	1996 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	180	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	280	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	57	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	15	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	296	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	4	80	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	80	1998 C	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Lampetra planeri	1096	6			D22	SH	eigene Erhebungen	
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		10	1998 A	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Trockene europäische Heiden	4030		25	1998 B	D22	SH	LANU	1999
1623-920	Mittleres Sorgetal und Lohe-Garlbecker Heide	Lebende Hochmoore	7110		5	1990 B	D22	SH	LANU	1999
1820-920	Nordermieleniederung	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	15	B	D22	SH	LANU	1999
1820-920	Nordermieleniederung	Lutra lutra	1355	1			D22	SH	Amt für Land- und	1987
1820-920	Nordermieleniederung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	20	B	D22	SH	LANU	1999
1820-920	Nordermieleniederung	Misgurnus fossilis	1145	1			D22	SH	eigene Erhebungen	
1820-920	Nordermieleniederung	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1820-920	Nordermieleniederung	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	5	1996 B	D22	SH	LANU	1999
1820-920	Nordermieleniederung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1820-920	Nordermieleniederung	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	110	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1821-920	Riesewohld	Lutra lutra	1355	2			D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	4	130	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1821-920	Riesewohld	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	40	1999 B	D22	SH	LANU	1999
1821-920	Riesewohld	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	Moorwälder	91D0	6	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1		D22	SH	eigene Erhebungen	
1821-920	Riesewohld	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1		D22	SH	eigene Erhebungen	

1823-920	Haaler Au-Gebiet	Aspius aspius	1130	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1823-920	Haaler Au-Gebiet	Cobitis taenia	1149	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1823-920	Haaler Au-Gebiet	Lampetra planeri	1096	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1923-920	Schierenwald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	200 1998 B	D22	SH	LANU	1999
1923-920	Schierenwald	Triturus cristatus	1166	3	1995	D22	SH	LANU	1999
1923-920	Schierenwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1998 B	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Petromyzon marinus	1095	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Myotis myotis	1324	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Myotis dasycneme	1318	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Myotis bechsteini	1323	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	380 1999 B	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Lampetra fluviatilis	1099	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Lampetra planeri	1096	2	1 1995	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Triturus cristatus	1166	2	1 1999	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	51 1999 B	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	60 1999 B	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
1924-920	Naturpark Aukrug	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	1 1999 B	D22	SH	LANU	1999
1924-920	Naturpark Aukrug	Trockene europäische Heiden	4030		12 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2022-920	Hochmoore zwischen Kluwe und Vaale	Graphoderus bilineatus	1082	1	1992	D22	SH	eigene Erhebungen	
2022-920	Hochmoore zwischen Kluwe und Vaale	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2026-920	Osterautal	Petromyzon marinus	1095	2		D22	SH	Neumann, M.	1994
2026-920	Osterautal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	17 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	3 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	70 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Lampetra fluviatilis	1099	5		D22	SH	Neumann, M.	1994
2026-920	Osterautal	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	6	45 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Lampetra planeri	1096	7		D22	SH	Neumann, M.	1994
2026-920	Osterautal	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	6 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	6 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2026-920	Osterautal	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	15 1998 A	D22	SH	LANU	1999
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	4	40 1998 C	D22	SH	LANU	1999
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	25 1998 B	D22	SH	LANU	1999
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	7	30 1998 B	D22	SH	LANU	1999
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	20 1998 B	D22	SH	LANU	1999
2026-921	Barker und Wittenborner Heide	Trockene europäische Heiden	4030		30 1998 B	D22	SH	LANU	1999
2122-920	Binnendünengelände Nordoe	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	60 B	D22	SH	LANU	1999
2122-920	Binnendünengelände Nordoe	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	5	50 1995 B	D22	SH	LANU	1999
2122-920	Binnendünengelände Nordoe	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	40 B	D22	SH	LANU	1999
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Moorwälder	91D0	7	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2124-920	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Osmoderma eremita	1084	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Birken-Moorwald	91D1	4	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Moorwälder	91D0	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Trockene europäische Heiden	4030		1	D22	SH	eigene Erhebungen	

2224-920	Himmelmoor, einschl. Bilsbek-Niederung mit	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Aspius aspius	1130	3		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Petromyzon marinus	1095	3		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Lampetra fluviatilis	1099	6		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	6	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Lampetra planeri	1096	8		D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	6440		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2224-921	Obere und mittlere Krückau mit Nebenflüssen	Trockene europäische Heiden	4030		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2226-901	Duvenstedter Brook	Birken-Moorwald	91D1	1	80	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Vertigo moulinsiana	1016	1		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	51	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Unio crassus	1032	1		B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	5	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	3	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Leucorrhinia pectoralis	1042	3		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Lutra lutra	1355	3		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Triturus cristatus	1166	4		B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	36	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	9	5	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		2	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		3	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-901	Duvenstedter Brook	Trockene europäische Heiden	4030		4	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Unio crassus	1032	2		B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	80	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	2	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Lutra lutra	1355	4		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	2	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Triturus cristatus	1166	5		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	7	30	1981 A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Lampetra planeri	1096	9		A	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-902	NSG Wohldorfer Wald	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1981 B	D22	HH	eigene Erhebungen
2226-920	Oberalsternniederung	Lampetra fluviatilis	1099	2	1		D22	SH	eigene Erhebungen
2226-920	Oberalsternniederung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	10	1998 B	D22	SH	LANU
2226-920	Oberalsternniederung	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	410	1998 B	D22	SH	LANU
2226-920	Oberalsternniederung	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	9	1998 B	D22	SH	LANU
2226-920	Oberalsternniederung	Lampetra planeri	1096	3	1		D22	SH	eigene Erhebungen
2226-920	Oberalsternniederung	Unio crassus	1032	3		1991	D22	SH	eigene Erhebungen
2226-920	Oberalsternniederung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		13	1998 B	D22	SH	LANU
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	1		D22	SH	eigene Erhebungen
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Moorwälder	91D0	2	5	1999 B	D22	SH	LANU
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Vertigo moulinsiana	1016	2			D22	SH	eigene Erhebungen
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	5	1999 A	D22	SH	LANU
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Leucorrhinia pectoralis	1042	4			D22	SH	eigene Erhebungen

2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	6 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1999 A	D22	SH	LANU	1999
2227-920	Klein Hansdorfer Brook und Ammersbektal	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		8 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Ästuarien	1130	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Alosa fallax	1103	1		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Misgurnus fossilis	1145	2		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Aspius aspius	1130	4		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Petromyzon marinus	1095	4		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Lampetra fluviatilis	1099	7		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Moorwälder	91D0	9	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Lampetra planeri	1096	10		D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	11	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2322-920	Pinnau zwischen Uetersen und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-901	NSG Schnaakenmoor	Triturus cristatus	1166	1	30 1999 B	D22	HH	eigene Erhebungen	
2324-901	NSG Schnaakenmoor	Birken-Moorwald	91D1	3	3 1999 B	D22	HH	eigene Erhebungen	
2324-901	NSG Schnaakenmoor	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	7	3 1999 B	D22	HH	eigene Erhebungen	
2324-901	NSG Schnaakenmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	10 1999 A	D22	HH	eigene Erhebungen	
2324-901	NSG Schnaakenmoor	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	8	12 1999 B	D22	HH	eigene Erhebungen	
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	5 1981 C	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	90 1981 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	10 1997 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	6	5 1997 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	20 1981 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Triturus cristatus	1166	6		D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	35 1997 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	9	7 1997 B	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Feuchte Dünentäler	2190		5 1997 C	D22	SH	LANU	1999
2324-920	Holmer Sandberge und Buttermoor	Trockene europäische Heiden	4030		5 1997 B	D22	SH	LANU	1999
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	144 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Birken-Moorwald	91D1	5	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Moorwälder	91D0	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2324-921	Tävsmoor, Haselauer Moor mit Happelbachwiesen	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1999 B	D22	SH	LANU	1999
2428-920	Sachsenwald	Triturus cristatus	1166	7		D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Moorwälder	91D0		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2428-920	Sachsenwald	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2527-922	NSG Dalbekschlucht	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	60 A	D22	SH	LANU	1999
2527-922	NSG Dalbekschlucht	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	3 A	D22	SH	LANU	1999
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Triturus cristatus	1166	8		D22	SH	eigene Erhebungen	
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	9	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2528-920	Gülzower Holz und Rühlauer Forst	Moorwälder	91D0		1	D22	SH	eigene Erhebungen	

2529-920	Großer Brook (westl. Lüttau)	Cobitis taenia	1149	3	1990	D22	SH	LANU	1999
2529-920	Großer Brook (westl. Lüttau)	Misgurnus fossilis	1145	3	1990	D22	SH	LANU	1999
2529-920	Großer Brook (westl. Lüttau)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	7	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Aspius aspius	1130	2	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Cobitis taenia	1149	2	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Lampetra fluviatilis	1099	3	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Lampetra planeri	1096	4	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		3	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Trockene, kalkreiche Sandrasen	6120		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-920	Hohes Elbufer und Elbwarder von Landesgrenze bis	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	6440		5	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-921	NSG Dalbekschlucht	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	10	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-921	NSG Dalbekschlucht	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-921	NSG Dalbekschlucht	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-921	NSG Dalbekschlucht	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-922	Waldgebiet bei Börnsen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-922	Waldgebiet bei Börnsen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2628-922	Waldgebiet bei Börnsen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130		1	D22	SH	eigene Erhebungen	
2218-951	Falkenburger Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	15 1992	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2218-951	Falkenburger Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	4 1992	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2218-951	Falkenburger Moor	Moorwälder	91D0	6	2 1992	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2221-990	Oederquarter Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	10 1992 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2221-990	Oederquarter Moor	Birken-Moorwald	91D1	4	7 1992 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2221-990	Oederquarter Moor	Lebende Hochmoore	7110		1 1992 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Rhodeus sericeus amarus	1134	1	1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Petromyzon marinus	1095	1	1998	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Lampetra fluviatilis	1099	1	1998	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Misgurnus fossilis	1145	1	1990	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Lampetra planeri	1096	1	1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Cobitis taenia	1149	1	1990	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Ästuarien	1130	1	11424 1999 C	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Aspius aspius	1130	1	1998	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Alosa alosa	1102	1		D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Coregonus lavaretus oxyrinchus	1113	1	1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Alosa fallax	1103	1	1 1998	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	50 1999 C	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Acipenser sturio	1101			D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Phoca vitulina	1365		1998	D24	SH	LANU	1999
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Oenanthe conioides	1601			D24	SH	Below, H., H.-H. Poppendiek & C.	1996
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-920	Unterelbe zwischen Glückstadt und Hamburg	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		1	D24	SH	eigene Erhebungen	
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Petromyzon marinus	1095	2	1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Misgurnus fossilis	1145	2		D24	NI	eigene Erhebungen	
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Lampetra fluviatilis	1099	2	1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	20 1999	D24	NI	eigene Erhebungen	
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Alosa fallax	1103	2	1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Aspius aspius	1130	2	1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Ästuarien	1130	6	150 1993	D24	NI	Bezirksregierung Lüneburg	1993
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	1 1993	D24	NI	Bezirksregierung Lüneburg	1993
2222-950	Wischhafener Süderelbe	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1993	D24	NI	Bezirksregierung Lüneburg	1993
2222-994	Unterelbe	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	1	1 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	65 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999

2222-994	Unterelbe	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1	1999	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Ästuarien	1130	2	1570 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Lampetra planeri	1096	2	1999	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Alosa fallax	1103	3	1999	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Misgurnus fossilis	1145	3	1999	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-994	Unterelbe	Aspius aspius	1130	3	1999 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Lampetra fluviatilis	1099	3	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2222-994	Unterelbe	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	6 1996	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	1 1999 C	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Oenanthe conioides	1601		150 1996	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2222-994	Unterelbe	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		1 1999 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Ophiogomphus cecilia	1037	1	1995	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	2	1999	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Cobitis taenia	1149	2	1999	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	20 1993	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Ästuarien	1130	3	1260 1989	D24	NI	Landkreis Stade	1989
2321-950	Oste (Unterlauf)	Petromyzon marinus	1095	3	1999	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	2 1996	D24	NI	Samtgemeinde Oldendorf	
2321-950	Oste (Unterlauf)	Lampetra fluviatilis	1099	4	1999	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Misgurnus fossilis	1145	4	1999	D24	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2321-950	Oste (Unterlauf)	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	20 1996	D24	NI	Samtgemeinde Oldendorf	
2321-950	Oste (Unterlauf)	Acipenser sturio	1101		1990	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-951	Jungclausheide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	1 1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-951	Jungclausheide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	1 1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-951	Jungclausheide	Moorwälder	91D0	5	3 1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-951	Jungclausheide	Lebende Hochmoore	7110		1 1993	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2322-951	Wald bei Groß Sterneberg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	10 1987 B	D24	NI	Landkreis Stade	1989
2322-952	Wasserkruger Moor	Moorwälder	91D0	3	13 1986 B	D24	NI	Landkreis Stade	o.J.
2323-950	Elbufer Bützflether Sand	Ästuarien	1130	7	99 1985 B	D24	NI	Stadt Stade	1985
2323-950	Elbufer Bützflether Sand	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	1	D24	NI	eigene Erhebungen	
2422-994	Schwingetal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	5 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	3 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Cottus gobio	1163	1	1991	D24	NI	Sport-Anglerverein e.V. Stade	1991
2422-994	Schwingetal	Lutra lutra	1355	1	1981	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Moorwälder	91D0	1	40 1999 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	15 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Ophiogomphus cecilia	1037	2	1999	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	5 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	10 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	60 1999 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	3	1991	D24	NI	Sport-Anglerverein e.V. Stade	1991
2422-994	Schwingetal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	20 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Lampetra planeri	1096	3	1990	D24	NI	Sport-Anglerverein e.V. Stade	1991
2422-994	Schwingetal	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	30 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Lampetra fluviatilis	1099	5	1990	D24	NI	Sport-Anglerverein e.V. Stade	1991
2422-994	Schwingetal	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	1 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	1 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Trockene europäische Heiden	4030		3 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2422-994	Schwingetal	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		2 1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Ästuarien	1130	4	730 1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	20 1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Aspius aspius	1130	4	1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Alosa fallax	1103	4	1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	

2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Petromyzon marinus	1095	4	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Misgurnus fossilis	1145	5	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Lampetra fluviatilis	1099	6	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		10	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2424-902	Komplex NSG Neßsand u. LSG Mühlenberger Loch	Oenanthe conioides	1601			1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2424-950	Unterlauf Este	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	4	1993		D24	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2424-950	Unterlauf Este	Petromyzon marinus	1095	5	1993		D24	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2424-950	Unterlauf Este	Alosa fallax	1103	5	1993		D24	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2424-950	Unterlauf Este	Aspius aspius	1130	5			D24	NI	Stadt Buxtehude	1984
2424-950	Unterlauf Este	Ästuarien	1130	5	165	1992	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2424-950	Unterlauf Este	Lampetra fluviatilis	1099	7			D24	NI	Stadt Buxtehude	1984
2424-950	Unterlauf Este	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	5	1992	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2424-950	Unterlauf Este	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	1		D24	NI	Landkreis Stade	o.J.
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	16	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	7	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	1	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	1	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2426-901	Boberger Düne u. Hangterrassen	Trockene, kalkreiche Sandrasen	6120		1	1999	C	D24	HH	eigene Erhebungen
2524-951	Nincoper Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	7	1999		D24	NI	eigene Erhebungen
2524-951	Nincoper Moor	Moorwälder	91D0	2	15	1999		D24	NI	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Coregonus oxyrhynchus	1113	1		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	27	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Cobitis taenia	1149	3		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Petromyzon marinus	1095	6		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Misgurnus fossilis	1145	6		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Aspius aspius	1130	6			A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Alosa fallax	1103	6		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Lampetra fluviatilis	1099	8		1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Ästuarien	1130	9	55	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		3	1998	C	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Oenanthe conioides	1601			1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-902	Komplex NSG Heuckenlock u. NSG Schweenssand	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		20	1998	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-903	Die Reit	Triturus cristatus	1166	1	281	1999	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-904	Kirchwerder Wiesen	Rhodeus sericeus amarus	1134	2		1999	A	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-904	Kirchwerder Wiesen	Triturus cristatus	1166	2		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-904	Kirchwerder Wiesen	Cobitis taenia	1149	4		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-904	Kirchwerder Wiesen	Misgurnus fossilis	1145	7		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2526-990	Untere Seeveniederung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	150	1991	B	D24	NI	eigene Erhebungen
2526-990	Untere Seeveniederung	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1991	B	D24	NI	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	1	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	1	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Cobitis taenia	1149	5		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	6	2	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	7	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Aspius aspius	1130	7		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Alosa fallax	1103	7		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Petromyzon marinus	1095	7			B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Ästuarien	1130	8	60	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Misgurnus fossilis	1145	8		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Lampetra fluviatilis	1099	9		1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2527-901	Borghorster Elblandschaft	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	6440		4	1999	B	D24	HH	eigene Erhebungen
2528-950	Teiche N Brandfeldsee	Triturus cristatus	1166	3		1985	B	D24	NI	eigene Erhebungen
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	25	1999	B	D24	NI	Niedersächsisches
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	1	1999	B	D24	NI	Niedersächsisches
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	6	1999	B	D24	NI	Niedersächsisches

2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	3	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	2	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Ophiogomphus cecilia	1037	3		1986	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	1	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	1	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Lampetra planeri	1096	4		1995 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Triturus cristatus	1166	4		1984	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	30	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	15	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Moorwälder	91D0	7	2	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Lampetra fluviatilis	1099	10		1995	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	1	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Thesium ebracteatum	1437			1999 A	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Trockene europäische Heiden	4030		10	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Lebende Hochmoore	7110		1	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2624-994	Este, Böttersheimer Heide	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D24	NI	Niedersächsisches	1999
2626-954	Kleines und Großes Brack N Stellee	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	8	1985 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2626-954	Kleines und Großes Brack N Stellee	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1985 C	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Coregonus oxyrhynchus	1113	2		1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Rhodeus sericeus amarus	1134	3		1998 C	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Cobitis taenia	1149	6		1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	8	1987 C	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Petromyzon marinus	1095	8		1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Alosa fallax	1103	8		1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Aspius aspius	1130	8		1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Misgurnus fossilis	1145	9		1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	2	1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Ästuarien	1130	10	35	1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Lampetra fluviatilis	1099	11		1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		5	1998 B	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		20	1998 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-901	Komplex NSG Zollenspieker u. NSG Kiebitzbrack	Oenanthe conioidea	1601			1995 A	D24	HH	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	5	1992 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	5		1992 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Petromyzon marinus	1095	9		1992 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Misgurnus fossilis	1145	10		1987 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Lampetra fluviatilis	1099	12		1992 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		55	1990 A	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-953	Luhe von Winsen bis Mündung mit	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt	1140		20	1990 A	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-954	Feuchtgebiete E Laßrönne	Triturus cristatus	1166	5		1985 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-954	Feuchtgebiete E Laßrönne	Misgurnus fossilis	1145	11		1985 A	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-954	Feuchtgebiete E Laßrönne	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		11	1985 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2627-956	Bullteiche E Winsen/Luhe	Cobitis taenia	1149	7		1985 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-958	Brack am Drennhäuser Hinterdeich	Cobitis taenia	1149	8		1985	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-965	Roddau mit Nebenbächen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	76	1996 B	D24	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2627-965	Roddau mit Nebenbächen	Lampetra planeri	1096	5		1995	D24	NI	eigene Erhebungen	
2627-966	Eichenwälder bei Sangenstedt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	41	A	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2627-966	Eichenwälder bei Sangenstedt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	1	A	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2628-954	Ordersee NW Büttlingen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	15	1981 B	D24	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2628-956	Griems Kuhle NE Oldershausen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	4	1985 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2628-956	Griems Kuhle NE Oldershausen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1985 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	10	1996 B	D24	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	Ophiogomphus cecilia	1037	4		1999 B	D24	NI	eigene Erhebungen	
2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	5	1996 B	D24	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	Petromyzon marinus	1095	10		2001	D24	NI	eigene Erhebungen	

2628-957	Ilmenauniederung von Lüneburg bis Wittorf	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		10	1996 B	D24	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	250	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	80	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	10	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	25	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	10	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion	2170	1	1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Leucorhinia pectoralis	1042	2		1997 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	4	7	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Trockene europäische Heiden	4030		95	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Lebende Hochmoore	7110		1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Feuchte Dünentäler	2190		1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation	2130		17	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und	2180		5	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2117-994	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum	2140		25	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2306-901	Wälder um Hage	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	200	1995	D25	NI	eigene Erhebungen	
2306-901	Wälder um Hage	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	200	1995	D25	NI	eigene Erhebungen	
2306-901	Wälder um Hage	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	5	1995	D25	NI	eigene Erhebungen	
2306-950	Borkum-Riffgrund	Alosa alosa	1102	1			D25	NI	eigene Erhebungen	
2306-950	Borkum-Riffgrund	Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung	1110		72000	1999	D25	NI	eigene Erhebungen	
2306-950	Borkum-Riffgrund	Acipenser sturio	1101			1999	D25	NI	eigene Erhebungen	
2317-950	Weddewardener Außendeich	Alosa fallax	1103	1			D25	HB	eigene Erhebungen	
2317-950	Weddewardener Außendeich	Petromyzon marinus	1095	1			D25	HB	eigene Erhebungen	
2317-950	Weddewardener Außendeich	Ästuarien	1130	6	1		D25	HB	eigene Erhebungen	
2413-953	Fledermausquartier Rahrdom	Myotis dasycneme	1318	2	10	2000	D25	NI	eigene Erhebungen	
2414-950	Teichfledermausquartier Rüstersiel	Myotis dasycneme	1318	1	100	2000	D25	NI	eigene Erhebungen	
2417-950	Bremerhavener Weserwatt	Alosa fallax	1103	2			D25	HB	eigene Erhebungen	
2417-950	Bremerhavener Weserwatt	Petromyzon marinus	1095	2			D25	HB	eigene Erhebungen	
2417-950	Bremerhavener Weserwatt	Ästuarien	1130	7	1		D25	HB	eigene Erhebungen	
2513-950	Altwasser Hissenhausen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	1	1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2513-951	Altwasser Münsterland	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	1	1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	Rhodeus sericeus amarus	1134	1		1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	Aspius aspius	1130	1		1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	Lampetra planeri	1096	1		1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	Misgurnus fossilis	1145	1		1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2513-952	Friedeburger Tief mit Schiffsbälje und Bitze	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	32	1999 A	D25	NI	Landkreis Wittmund	1999
2517-950	Vorland der Luneplate	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	42	1989	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2517-950	Vorland der Luneplate	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	6	1989	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2608-950	Rysumer Nacken	Primärdünen	2110	1	1	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	14	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Ästuarien	1130	3	1000	1995 A	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation	2130		4	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Feuchte Dünentäler	2190		9	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		37	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-950	Rysumer Nacken	Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria	2120		7	1997 B	D25	NI	Gemeinde Krummhörn	1997
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	1	550	1977	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1		1997	D25	NI	IBL	1997
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Coregonus oxyrhynchus	1113	1		1997	D25	NI	IBL	1997
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Ästuarien	1130	1	9413	1992 A	D25	NI	Stadt Emden	1996
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Lampetra fluviatilis	1099	1		1997	D25	NI	IBL	1997
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Rhodeus sericeus amarus	1134	2		1997	D25	NI	IBL	1997
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Petromyzon marinus	1095	3		1997	D25	NI	IBL	1997

2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Flache große Meeressarme und -buchten	1160	1	1977	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Phoca vitulina	1365		1997	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Pioniervegetation mit Salicornia und anderen	1310	20	1999	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt	1140	224	1993 n	D25	NI	Stadt Emden	1996
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria	2120	1	1992 B	D25	NI	Stadt Emden	1996
2608-952	Dollart und Ems von Emden bis Höhe Eemshaven	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation	2130	1	1992 B	D25	NI	Stadt Emden	1996
2608-953	Großer See I (Statoil-Gelände Rysumer Nacken)	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	2	1998 B	D25	NI	Ökowerk Emden e.V.
2609-950	Bansmeer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	43	1992 B	D25	NI	Stadt Emden
2609-951	Uphuser Meer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	10	1992 A	D25	NI	Stadt Emden
2609-952	Teichfledermaus-Jagdgebiet Binnenhafen	Myotis dasycneme	1318	3	1997	D25	NI	eigene Erhebungen	1996
2614-994	Neuenburger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	280	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches
2614-994	Neuenburger Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	3	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches
2614-994	Neuenburger Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	5	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches
2614-994	Neuenburger Holz	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		20	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches
2615-951	Jaderkreuzmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	15	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen
2615-951	Jaderkreuzmoor	Birken-Moorwald	91D1	4	1	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen
2615-951	Jaderkreuzmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	20	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen
2615-951	Jaderkreuzmoor	Lebende Hochmoore	7110		10	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen
2617-994	Rechter Nebenarm der Weser bei Brake	Ästuarien	1130	4	515	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches
2617-994	Rechter Nebenarm der Weser bei Brake	Myotis dasycneme	1318	4	1999	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2709-950	Süderkolk	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	2	1991 B	D25	NI	Landkreis Leer
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Cobitis taenia	1149	1	1997	D25	NI	IBL	1997
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Lutra lutra	1355	1	1985	D25	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Coregonus oxyrhynchus	1113	2		D25	NI	eigene Erhebungen	
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	2	1997	D25	NI	IBL	1997
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Lampetra fluviatilis	1099	2	1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Ästuarien	1130	2	2249	1996 A	D25	NI	Landkreis Leer
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Alosa alosa	1102	2	1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1995
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Misgurnus fossilis	1145	2	1997	D25	NI	IBL	1993
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia	1330	2	161	1999 B	D25	NI	Landkreis Leer
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Alosa fallax	1103	3	1997	D25	NI	IBL	1995
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Rhodeus sericeus amarus	1134	3	1997	D25	NI	IBL	1997
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Petromyzon marinus	1095	4	1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1997
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	5	1997	D25	NI	F&N Umweltconsult
2710-951	Ems von Emden bis Leer	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt	1140		1	1996 A	D25	NI	Landkreis Leer
2711-950	Leda-Jümme	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	275	1991 A	D25	NI	Rasper, M., Sellheim, P. &
2711-950	Leda-Jümme	Lutra lutra	1355	2	1980	D25	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1991
2711-950	Leda-Jümme	Lampetra fluviatilis	1099	3	1990	B	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.
2711-950	Leda-Jümme	Misgurnus fossilis	1145	3	1990	B	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.
2711-950	Leda-Jümme	Alosa alosa	1102	3	1990	A	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.
2711-950	Leda-Jümme	Petromyzon marinus	1095	5	1990	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2711-952	Terheide	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	3	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	0	1982	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Birken-Moorwald	91D1	2	80	1996 C	D25	NI	o.J.
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	120	1996 C	D25	NI	eigene Erhebungen
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	10	1996 B	D25	NI	eigene Erhebungen
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Lebende Hochmoore	7110		10	1996 B	D25	NI	eigene Erhebungen
2715-990	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1996 B	D25	NI	eigene Erhebungen
2716-958	Biotop Watkenstraße	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	10	1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen
2716-958	Biotop Watkenstraße	Misgurnus fossilis	1145	4	1998	A	D25	NI	eigene Erhebungen
2716-958	Biotop Watkenstraße	Rhodeus sericeus amarus	1134	4	1998	A	D25	NI	eigene Erhebungen
2718-994	Reitbruch	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	1	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches
2718-994	Reitbruch	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	7	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches
2718-994	Reitbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	6	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches
2718-994	Reitbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	1	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches

2718-994	Reitbruch	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	4	11	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2718-994	Reitbruch	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	1	30	1999 A	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	2	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Luronium natans</i>	1831	1		1990	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	1	470	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Moorwälder	91D0	1	340	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	415	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	3	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Cobitis taenia</i>	1149	2		1987	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	3		1992	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Lutra lutra</i>	1355	3		1996	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	50	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1099	4		1987	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Ästuarien	1130	5	100	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	5		1986	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	7	2	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2719-994	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D25	NI	Niedersächsisches	1999
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	2	7	1993 B	D25	NI	Landkreis Leer	1995
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	254	1993 B	D25	NI	Landkreis Leer	1995
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1134	5		1990 C	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	6		1990 A	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1993 B	D25	NI	Landkreis Leer	1995
2810-950	Ems von Leer bis Papenburg	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		1	1993 B	D25	NI	Landkreis Leer	1995
2810-951	Pfeifengraswiese Breinermoor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	2	1995 A	D25	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2810-952	Kleingewässer bei Weekeborg	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	7	1993 B	D25	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2810-952	Kleingewässer bei Weekeborg	<i>Luronium natans</i>	1831	2		1993 B	D25	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2811-952	Leda-Altarm Nehse	<i>Lutra lutra</i>	1355	4		1980	D25	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
2811-952	Leda-Altarm Nehse	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	2	1990 A	D25	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2811-953	Leda-Altarm Groene Barg	<i>Lutra lutra</i>	1355	5		1980	D25	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
2811-953	Leda-Altarm Groene Barg	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	6	1990 A	D25	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2811-954	Leda-Altarm Warmse (Ubbehausen)	<i>Lutra lutra</i>	1355	6		1980	D25	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
2811-954	Leda-Altarm Warmse (Ubbehausen)	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	6	1990 B	D25	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2812-954	NSG Barge einschl. Badensee	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	7	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	<i>Myotis myotis</i>	1324	1		1998	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	23	1981 B	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	24	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	<i>Cobitis taenia</i>	1149	3		1993	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	<i>Salmo salar</i> (nur im Süßwasser)	1106	3		1998	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1099	5		1993	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	<i>Petromyzon marinus</i>	1095	6		1993	D25	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	1	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		6	1994 B	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2816-950	Huntetal Oldenburg bis Mündung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-951	Holler- und Wittemoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	120	1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-951	Holler- und Wittemoor	Birken-Moorwald	91D1	5	1	1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-951	Holler- und Wittemoor	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	5	1	1999 C	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-951	Holler- und Wittemoor	Lebende Hochmoore	7110		1	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-952	Quellmoor	Birken-Moorwald	91D1	3	10	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen	
2816-952	Quellmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	21	1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-950	Werderland	<i>Cobitis taenia</i>	1149	4		1999 A	D25	HB	BioConsult Schuchardt & Scholle	1999
2817-950	Werderland	<i>Myotis dasycneme</i>	1318	5		1999	D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-953	Lesum	<i>Cottus gobio</i>	1163	1			D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-953	Lesum	<i>Aspius aspius</i>	1130	2			D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-953	Lesum	<i>Lampetra planeri</i>	1096	2			D25	HB	eigene Erhebungen	

2817-953	Lesum	Alosa fallax	1103	4		D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-953	Lesum	Lampetra fluviatilis	1099	6		D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-953	Lesum	Ästuarien	1130	8	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	20 1981 B	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2817-954	Ochtumer Sand	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	9 1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Rhodeus sericeus amarus	1134	6	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	21 1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Lutra lutra	1355	7	1999	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Lampetra fluviatilis	1099	7	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-954	Ochtumer Sand	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3 1999 A	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	100 1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Misgurnus fossilis	1145	7	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Rhodeus sericeus amarus	1134	7	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Lampetra fluviatilis	1099	8	1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	1 1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		100 1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2817-955	Juliane Plate-Westergate-Warflether Sand	Phoca vitulina	1365		4 1999 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2818-952	Dunger See	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	2	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2818-953	Grambker Feldmarksee	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	3	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2818-955	Niedervieland	Cobitis taenia	1149	5	1999	D25	HB	F&N Umweltconsult GmbH	2000
2818-955	Niedervieland	Misgurnus fossilis	1145	8	1999	D25	HB	F&N Umweltconsult GmbH	2000
2818-956	Blockland	Cobitis taenia	1149	6	1999 A	D25	HB	F&N Umweltconsult GmbH	2000
2818-956	Blockland	Myotis dasycneme	1318	6	1999	D25	HB	eigene Erhebungen	
2818-956	Blockland	Lutra lutra	1355	8		D25	HB	eigene Erhebungen	
2818-956	Blockland	Misgurnus fossilis	1145	9	1999	D25	HB	F&N Umweltconsult GmbH	2000
2818-957	Eremit-Vorkommen Sankt Magnus	Osmoderma eremita	1084	1	2000	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Graphoderus bilineatus	1082	1	6 2000	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	4	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Cobitis taenia	1149	7		D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Misgurnus fossilis	1145	10		D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-950	Hollerland und Kuhgrabensee	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-951	Farger Heide und Heideweiher	Triturus cristatus	1166	1		D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-951	Farger Heide und Heideweiher	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-951	Farger Heide und Heideweiher	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	2	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-951	Farger Heide und Heideweiher	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	4	1	D25	HB	eigene Erhebungen	
2819-952	Eremit-Vorkommen Lehe	Osmoderma eremita	1084	2	2000	D25	HB	eigene Erhebungen	
2915-950	NSG "Osenberge"	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	5 1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2915-950	NSG "Osenberge"	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	3	1 1998 B	D25	NI	eigene Erhebungen	
2918-950	Kladdinger Wiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	12 1992	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-950	Kladdinger Wiesen	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	3 1992	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-950	Kladdinger Wiesen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	4 1999	D25	NI	eigene Erhebungen	
2918-950	Kladdinger Wiesen	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	6440		8 1992	D25	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-950	Kladdinger Wiesen	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		1 1999	D25	NI	eigene Erhebungen	
2918-952	Eremit-Vorkommen Bürgerpark Findorf	Osmoderma eremita	1084	3	2000	D25	HB	eigene Erhebungen	
2919-953	Eremit-Vorkommen Oberneuland	Osmoderma eremita	1084	4	2000	D25	HB	eigene Erhebungen	
2311-952	Stuhlleide im Dunumer Brook	Misgurnus fossilis	1145	1	1999 B	D26	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2311-952	Stuhlleide im Dunumer Brook	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	10 1999 B	D26	NI	Landkreis Wittmund	1999
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	108 1977 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	700 1977 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	1 1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	1 1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	1 1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	7	1 1977 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Birken-Moorwald	91D1	10	5 1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2410-990	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1977	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2412-950	Eichenwald bei Borgholt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	4	1999 B	D26	NI	Landkreis Wittmund	1999
2413-951	Staatsforst Upjever	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	137	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2413-951	Staatsforst Upjever	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	180	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2413-951	Staatsforst Upjever	Moorwälder	91D0	3	45	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2413-952	Barkeler Busch, Nettekrs Busch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	32	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2413-952	Barkeler Busch, Nettekrs Busch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	42	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2413-952	Barkeler Busch, Nettekrs Busch	Moorwälder	91D0	7	10	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2509-994	Großes Meer	Lutra lutra	1355	1		1980	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2509-994	Großes Meer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	500	1999 A	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2509-994	Großes Meer	Luronium natans	1831	2	25	1985	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2509-994	Großes Meer	Myotis dasycneme	1318	2		2000 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2509-994	Großes Meer	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	6	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2509-994	Großes Meer	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2510-950	Groen Breike	Lutra lutra	1355	2		1980	D26	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
2510-950	Groen Breike	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	22	1987 A	D26	NI	Mühlen von der, G.	1987
2510-951	Schlitzdistel-Pfeifengraswiese bei Forlitz-Blaukirchen	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	3	1996 A	D26	NI	eigene Erhebungen	
2510-952	Ihlower Forst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	322	1996 B	D26	NI	Rettig, K.	1996
2510-952	Ihlower Forst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	1	1990 B	D26	NI	Garve, E.	1993
2510-954	Teichfledermaus-Jagdgebiet Ringkanal	Myotis dasycneme	1318	1	50	2000	D26	NI	eigene Erhebungen	
2511-950	Osteregelser Moor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	2	1996 A	D26	NI	eigene Erhebungen	
2511-950	Osteregelser Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	4	1991 B	D26	NI	Mühlen von der, G.	1991
2511-950	Osteregelser Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	1	1991 B	D26	NI	Mühlen von der, G.	1991
2511-950	Osteregelser Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	84	1991 B	D26	NI	Mühlen von der, G.	1991
2511-950	Osteregelser Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1991 B	D26	NI	Mühlen von der, G.	1991
2511-953	Hooge Brinken	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	12	1994 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2513-990	Schwarzes Meer	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	3	3	1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2513-990	Schwarzes Meer	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	4	4	1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2513-990	Schwarzes Meer	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	1	1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2513-990	Schwarzes Meer	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	1	1977 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2610-994	Fehntjer Tief	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	70	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	40	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Luronium natans	1831	1	50	1989	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Cobitis taenia	1149	1		1984	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	8	1999 A	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	50	1999 A	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	50	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Lutra lutra	1355	3		1996	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2610-994	Fehntjer Tief	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2613-950	Klosterhof Lindern	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	20	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-951	Klosterhof Jührden	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	65	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-951	Klosterhof Jührden	Moorwälder	91D0	6	18	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-953	Bockhorner Moor	Triturus cristatus	1166	1		1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-953	Bockhorner Moor	Moorwälder	91D0	1	120	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-953	Bockhorner Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	195	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-953	Bockhorner Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	4	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-953	Bockhorner Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		5	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2613-990	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	1000	1977 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2613-990	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	25	1977 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2613-990	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	Birken-Moorwald	91D1	4	30	1977 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2613-990	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	1	1977 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2614-950	Seghorner Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	185	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2614-951	Vareler Wald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	90	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2614-951	Vareler Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	35	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2614-952	Standortübungsplatz Varel-Friedrichsfelde	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	55	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	

2614-952	Standortübungsplatz Varel-Friedrichsfelde	Moorwälder	91D0	5	22	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2614-952	Standortübungsplatz Varel-Friedrichsfelde	Trockene europäische Heiden	4030		45	1996	D26	NI	Landkreis Friesland	
2710-950	Kiessee bei Neermoor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	5	1999 B	D26	NI	Diekmann & Mosebach	1999
2710-950	Kiessee bei Neermoor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	1	1999 B	D26	NI	Diekmann & Mosebach	1999
2710-950	Kiessee bei Neermoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	1	1999 B	D26	NI	Diekmann & Mosebach	1999
2711-953	Filsumer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	39	1995 B	D26	NI	Landkreis Leer	1995
2711-953	Filsumer Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	1	1995 B	D26	NI	Landkreis Leer	1995
2711-953	Filsumer Moor	Birken-Moorwald	91D1	11	5	1995 B	D26	NI	Landkreis Leer	1995
2711-954	Holtlander Ehe	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	34	1981 B	D26	NI	Dahl, H.-J. & M. Hullen	1989
2714-950	Ammerländer Büsche	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	162	1998 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2714-950	Ammerländer Büsche	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	86	1998 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2714-950	Ammerländer Büsche	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1998 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2714-950	Ammerländer Büsche	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		4	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2810-953	Völlenerkönigsfehrer Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	1	1993 B	D26	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2810-953	Völlenerkönigsfehrer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	1	1993 B	D26	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2810-953	Völlenerkönigsfehrer Moor	Birken-Moorwald	91D1	12	5	1993 B	D26	NI	Gemeinde Westoverledingen	1996
2811-950	Langholter Meer	Lampetra fluvialilis	1099	1		1990 B	D26	NI	Gaumert, D. & Kämmerit, M.	1993
2811-950	Langholter Meer	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	6	1990 B	D26	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2811-950	Langholter Meer	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	17	1990 A	D26	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2811-950	Langholter Meer	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		1	1990 B	D26	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2811-951	Wald bei Potshausen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	6	1990 B	D26	NI	Gemeinde Ostrhauderfehn	1992
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	2	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	26	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	45	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	39	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	25	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Luronium natans	1831	3		1994	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	2	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	1	1998 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	19	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Lebende Hochmoore	7110		11	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Trockene europäische Heiden	4030		1	1994 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Birken-Moorwald	91D1		3	1994 B	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2812-952	Soesteniederung mit Barßeler Tief	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		30	1999 A	D26	NI	eigene Erhebungen	
2812-953	Drakamp-Schlatt	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	2	4	1994 C	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2813-951	Holtkamp	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	2	A	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2813-951	Holtkamp	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	9	A	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2813-951	Holtkamp	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	18	A	D26	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2910-990	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	700	1977 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2910-990	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	4	1977 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2910-990	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	Birken-Moorwald	91D1	8	10	1977 C	D26	NI	eigene Erhebungen	
2910-990	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1977 B	D26	NI	eigene Erhebungen	
2911-950	Brunselmeer	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	4	1993 B	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-950	Brunselmeer	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	10	1993 B	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-950	Brunselmeer	Birken-Moorwald	91D1	9	6	1993 B	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-950	Brunselmeer	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2	1993 A	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-950	Brunselmeer	Moorwälder	91D0		1	1993 B	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-950	Brunselmeer	Lebende Hochmoore	7110		1	1993 A	D26	NI	Gemeinde Rhaderfehn	1993
2911-951	Esterweger Dose	Moorwälder	91D0	2	95	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2911-951	Esterweger Dose	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	8	1999 B	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2911-951	Esterweger Dose	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	20	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2911-951	Esterweger Dose	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	550	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2911-951	Esterweger Dose	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2911-951	Esterweger Dose	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		10	1999	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2914-950	Lethetal	Lampetra planeri	1096	1		1990	D26	NI	Niedersächsisches	1999

2914-950	Lethetal	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	1	1 1998	D26	NI	eigene Erhebungen	
2914-950	Lethetal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	300 1998	D26	NI	eigene Erhebungen	
2914-950	Lethetal	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1099	2	1998	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2914-950	Lethetal	<i>Lutra lutra</i>	1355	4	1990	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2914-950	Lethetal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	1 1993	D26	NI	Niedersächsisches	1999
2914-950	Lethetal	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1 1993	D26	NI	Niedersächsisches	1999
3010-950	Dortmund-Ems-Seitenkanal	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	20 1993 B	D26	NI	Landkreis Emsland	1994
3010-950	Dortmund-Ems-Seitenkanal	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	40 1993 B	D26	NI	Landkreis Emsland	1994
3010-950	Dortmund-Ems-Seitenkanal	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	5	2 1993 B	D26	NI	Landkreis Emsland	1994
3010-950	Dortmund-Ems-Seitenkanal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	9	1 1993 C	D26	NI	Landkreis Emsland	1994
2218-991	Aßbütteler u. Herrschaftliches Moor	Birken-Moorwald	91D1	9	120 1995 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2218-991	Aßbütteler u. Herrschaftliches Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	60 1995 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2218-991	Aßbütteler u. Herrschaftliches Moor	Lebende Hochmoore	7110		8 1995 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2218-991	Aßbütteler u. Herrschaftliches Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1995 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2220-951	Wingst	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	2	100 1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2220-951	Wingst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	44 1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2220-951	Wingst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	25 1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2220-951	Wingst	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		5 1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2220-951	Wingst	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	4	17 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	7	2 1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	16 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	14	15 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	17	20 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Moorwälder	91D0	18	20 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	18	5 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110		1 1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Lebende Hochmoore	7110		2 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-950	Knüppelholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1 1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	220 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	250 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	1	1983	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	<i>Lutra lutra</i>	1355	3	1992	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	50 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	6 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Moorwälder	91D0	7	130 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	16	10 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	18	9 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	21	15 1999	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	22	7 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Lebende Hochmoore	7110		100 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2318-994	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1 1999	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	1	32	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	<i>Lampetra planeri</i>	1096	1	1999	D27	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	2	1999	D27	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		3	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2319-950	Wildes Moor, Stinstedter See	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		5	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2319-951	Moorwald Mühedeich	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	2	1999	D27	NI	Landkreis Cuxhaven	1999
2319-951	Moorwald Mühedeich	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2319-951	Moorwald Mühedeich	Moorwälder	91D0		3	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	56 1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	12	29 1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1 1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Trockene europäische Heiden	4030		6 1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2320-950	Hollbecker und Besenbecker Berg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-951	Hackemühlen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	7	2	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-951	Hackemühlen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	21	8	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-951	Hackemühlen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	22	6	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-951	Hackemühlen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-951	Hackemühlen	Trockene europäische Heiden	4030		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	1	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	65	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	80	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	130	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Lutra lutra	1355	4		1999	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	105	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	45	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	30	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Moorwälder	91D0	10	105	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2320-994	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	Lebende Hochmoore	7110		4	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2321-952	Himmelpfortener Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	33	6	1993 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-952	Himmelpfortener Wald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1993 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2321-952	Himmelpfortener Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		2	1987 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2421-950	Behrster Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	18	1987 B	D27	NI	Landkreis Stade	1989
2421-952	Wälder bei Kaken	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	14	1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-952	Wälder bei Kaken	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	29	8	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-952	Wälder bei Kaken	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-952	Wälder bei Kaken	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-952	Wälder bei Kaken	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1996 B	D27	NI	Samtgemeinde Oldendorf	
2421-956	Unterlauf der Oste	Ästuarien	1130	1	2	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2421-956	Unterlauf der Oste	Lampetra fluviatilis	1099	1		1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
2421-956	Unterlauf der Oste	Myotis dasycneme	1318	2	1	1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
2421-956	Unterlauf der Oste	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	9	23	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-956	Unterlauf der Oste	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	25	10	1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
2421-956	Unterlauf der Oste	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-956	Unterlauf der Oste	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-956	Unterlauf der Oste	Trockene europäische Heiden	4030		8	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-956	Unterlauf der Oste	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-990	Hohes Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	7	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-990	Hohes Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	210	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-990	Hohes Moor	Moorwälder	91D0	6	135	1992 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-990	Hohes Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2421-990	Hohes Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2422-955	Heidbeck/Stade-Süd	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	8	2	1995 B	D27	NI	Landkreis Stade	o.J.
2422-955	Heidbeck/Stade-Süd	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2422-955	Heidbeck/Stade-Süd	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2422-955	Heidbeck/Stade-Süd	Moorwälder	91D0		1	1995 B	D27	NI	Landkreis Stade	o.J.
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	15	13	1987 C	D27	NI	Landkreis Stade	1989
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	16	11	1995 B	D27	NI	Landkreis Stade	o.J.
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4	1992 B	D27	NI	Landkreis Stade	1989
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1992 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-950	Geestrand zwischen Horneburg und Stade	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-952	Alte Wälder Eicheneck und Horst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	20	17	1987 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-952	Alte Wälder Eicheneck und Horst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3	1987 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-990	Feerner Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	0	1997 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-990	Feerner Moor	Birken-Moorwald	91D1	13	80	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2423-990	Feerner Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	15	22	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-990	Feerner Moor	Lebende Hochmoore	7110		10	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2423-990	Feerner Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2428-990	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	Lutra lutra	1355	1	0	1983 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2428-990	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	150	1993 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2428-990	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	Birken-Moorwald	91D1	4	145	1993 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2428-990	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	35	1993 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2517-951	Teichfledermausquartier bei Schwegen	Myotis dasycneme	1318	1	130	2000	D27	NI	eigene Erhebungen	
2517-990	Placken-, Königs- u. Stoteler Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	80	1995 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2517-990	Placken-, Königs- u. Stoteler Moor	Moorwälder	91D0	11	100	1995 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2517-990	Placken-, Königs- u. Stoteler Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-950	Malse	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-950	Malse	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	20	A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-950	Malse	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-950	Malse	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches	1992
2519-950	Malse	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-950	Malse	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-952	Feuchtwaldkomplex NNW Volkmarst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	26	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-952	Feuchtwaldkomplex NNW Volkmarst	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	5	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Leucorrhinia pectoralis	1042	3		1986	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	80	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2519-994	Wollingster See mit Randmoor	Moorwälder	91D0		4	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2520-951	Barcheler Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	46	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-951	Barcheler Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	13	24	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-951	Barcheler Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	19	7	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-951	Barcheler Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Triturus cristatus	1166	2		1990	D27	NI	Landkreis Rotenburg (Wümme)	
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	17	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	46	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	20	7	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	32	7	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2520-952	Wald bei Franzhorn und Brillitermoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-950	Tinster Holz / Moore am Pulvermühlenbach	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	9	1992	D27	NI	Ornithologische	1996
2521-950	Tinster Holz / Moore am Pulvermühlenbach	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	22	6	1992	D27	NI	Ornithologische	1996
2521-950	Tinster Holz / Moore am Pulvermühlenbach	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	30	8	1987	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-950	Tinster Holz / Moore am Pulvermühlenbach	Moorwälder	91D0		7	1992	D27	NI	Ornithologische	1996
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Triturus cristatus	1166	3		1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	4	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	21	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	35	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	13	14	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-952	Beverner Wald (nördl. Teilbereich)	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		3	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2521-953	Horner Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	16	20	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	20	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	17	10	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	31	8	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-955	Im Wieh / Wälder am Westrand von Harsefeld	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-956	Hahnenhorst / Wohld	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	29	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-956	Hahnenhorst / Wohld	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	15	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-956	Hahnenhorst / Wohld	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2522-956	Hahnenhorst / Wohle	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Lutra lutra	1355	2	0	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	9	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	45	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	60	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	8	40	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	18	10	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	19	15	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Birken-Moorwald	91D1		1	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-990	Auetal und Nebentäler	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1993 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-991	Braken	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	60	1993 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	Triturus cristatus	1166	1	0	1994 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2522-991	Braken	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	120	1993 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	60	1993 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	20	1993 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	Moorwälder	91D0	14	50	1993 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1	1993	D27	NI	eigene Erhebungen	
2522-991	Braken	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		10	1993 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2523-950	Büntholz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	34	6	1987	D27	NI	Landkreis Stade	1989
2523-952	Kleingewässersystem Apenser Geest	Triturus cristatus	1166	4		1987	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	55	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	36	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	21	7	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2523-953	Neukloster Forst/Nottensdorfer Wälder	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Triturus cristatus	1166	5		1991	D27	NI	Plantago	1991
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	55	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Lutra lutra	1355	5		1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	36	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	29	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	7	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	18	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	11	5	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Moorwälder	91D0		2	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1995	D27	NI	Landkreis Osterholz	1995
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2618-950	Billerbeck-Niederung, Hellingster Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	4	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	11	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	11	12	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	16	21	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Moorwälder	91D0	17	24	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-951	Meinstedter Moor	Lebende Hochmoore	7110		8	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	70	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	3	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Ophiogomphus cecilia	1037	1		1995	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	100	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Aspius aspius	1130	1		1999	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Cottus gobio	1163	1		1989	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	70	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Lampetra planeri	1096	2		1999	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	110	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	75	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999

2621-994	Oste mit Nebenbächen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	8 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	35 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Lutra lutra	1355	6	1983 C	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Moorwälder	91D0	8	120 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	4 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	9	1 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	50 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	13	4 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	26	10 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		7 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2621-994	Oste mit Nebenbächen	Trockene europäische Heiden	4030		10 1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2622-954	Sellhorner Teiche	Triturus cristatus	1166	6	1989	D27	NI	eigene Erhebungen	
2622-954	Sellhorner Teiche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	4 1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2622-954	Sellhorner Teiche	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	12	15 1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2622-954	Sellhorner Teiche	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	15	7 1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2623-950	Wiegerner Forst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	20 1992 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2623-950	Wiegerner Forst	Triturus cristatus	1166	7	1987	D27	NI	Landkreis Stade	1989
2623-950	Wiegerner Forst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	36 1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2623-950	Wiegerner Forst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	17	11 1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2623-950	Wiegerner Forst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	22	12 1992 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2623-950	Wiegerner Forst	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1992	D27	NI	Landkreis Stade	o.J.
2623-951	Großes Everstorfer Moor	Moorwälder	91D0	5	140 1997 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-951	Großes Everstorfer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	13	30 1997 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-951	Großes Everstorfer Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2 1997 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-954	Thörenwald (Teilbereich)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	35 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-954	Thörenwald (Teilbereich)	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	14	2 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-954	Thörenwald (Teilbereich)	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	25 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-954	Thörenwald (Teilbereich)	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	15	15 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-955	Ramme	Cobitis taenia	1149	1	1999	D27	NI	Sportfischer-Verein Sittensen	1999
2623-955	Ramme	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2623-955	Ramme	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	7 1998 B	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1998
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	18 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Leucorrhinia pectoralis	1042	4	1998	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1998
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	3 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	7	27 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	9	21 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	18	18 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Lebende Hochmoore	7110		2 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Moorwälder	91D0		1 1998 B	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1998
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1998 B	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1998
2717-950	Garlstedter Moore und Heide	Trockene europäische Heiden	4030		155 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	25 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	3 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-952	Neuenkirchener Heide	Trockene europäische Heiden	4030		100 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	30 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	45 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	3 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	17	20 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	23	6 1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2717-953	Bachniederung bei Löhnhorst	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		2	1995	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-950	Schönebecker Aue	Lampetra fluviatilis	1099	2		1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-950	Schönebecker Aue	Lampetra planeri	1096	3		1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-950	Schönebecker Aue	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	55	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-950	Schönebecker Aue	Triturus cristatus	1166	8		1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-950	Schönebecker Aue	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	22	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-950	Schönebecker Aue	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-950	Schönebecker Aue	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-950	Schönebecker Aue	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1	1989	D27	NI	Biologische Station Osterholz	1989
2718-951	Oldenbütteler Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	15	23	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-951	Oldenbütteler Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches	1992
2718-951	Oldenbütteler Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-951	Oldenbütteler Holz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-951	Oldenbütteler Holz	Moorwälder	91D0		1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2718-951	Oldenbütteler Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1994 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2719-950	Günnemoor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1		1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2719-950	Günnemoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	25	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2719-950	Günnemoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	146	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2719-950	Günnemoor	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2719-950	Günnemoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2720-951	NSG "Hinter dem Wieh Brock"	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	9	1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-951	NSG "Hinter dem Wieh Brock"	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-951	NSG "Hinter dem Wieh Brock"	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		2	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-952	Hepstedter Büsche	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	12	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-952	Hepstedter Büsche	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2720-953	Wald W Wennebostel	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	20	6	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-953	Wald W Wennebostel	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	24	11	1993	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-955	Hudewald "In den Meddeln"	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	10	1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-955	Hudewald "In den Meddeln"	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		5	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2720-955	Hudewald "In den Meddeln"	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2721-954	Borstgrasrasen WSW Badenstedt	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	5	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2721-954	Borstgrasrasen WSW Badenstedt	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2721-954	Borstgrasrasen WSW Badenstedt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2721-954	Borstgrasrasen WSW Badenstedt	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Moorwälder	91D0	1	215	1992 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	3	1992 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	12	40	1992 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1992 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	1992 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2721-990	Bullensee, Hemelsmoor	Lebende Hochmoore	7110		1	1992 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2723-954	Eichenwald w Kalbe (BAB Raststelle Sittensen)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	14	14	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2723-954	Eichenwald w Kalbe (BAB Raststelle Sittensen)	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	28	9	1994	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	Cobitis taenia	1149	2		1999	D27	NI	Sportfischer-Verein Sittensen	1999
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	3	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2723-955	Oste oberhalb Sittensen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		3	1992	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2724-951	Glüsinger Bruch / Osterbruch / Knick	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	130	1994 A	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-951	Glüsinger Bruch / Osterbruch / Knick	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	20	1994 B	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-952	Kauers Wittmoor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	1	1998 C	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-952	Kauers Wittmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	9	1998 A	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-952	Kauers Wittmoor	Lebende Hochmoore	7110		2	1998 B	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-952	Kauers Wittmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1	1998 C	D27	NI	Landkreis Harburg	1994

2724-952	Kauers Wittmoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1998 B	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2724-952	Kauers Wittmoor	Trockene europäische Heiden	4030		1	1998 B	D27	NI	Landkreis Harburg	1994
2818-950	St. Jürgensland	Rhodeus sericeus amarus	1134	1		1994	D27	NI	BioS	1994
2818-950	St. Jürgensland	Lampetra fluviatilis	1099	3		1994	D27	NI	BioS	1994
2818-950	St. Jürgensland	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1994	D27	NI	BioS	1994
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Petromyzon marinus	1095	1		1993 A	D27	NI	Schirmer, M.	1986
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	28	1998 C	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	1		D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	7	1998 C	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	10	1998 C	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	120	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	700	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Rhodeus sericeus amarus	1134	2		1993 C	D27	NI	Schirmer, M.	1986
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	3	1998 A	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	1	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Ophiogomphus cecilia	1037	2			D27	NI	eigene Erhebungen	
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	246		D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	90	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	54		D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Misgurnus fossilis	1145	3		1993 A	D27	NI	Schirmer, M.	1986
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Moorwälder	91D0	3	175	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Lampetra planeri	1096	4		1993 A	D27	NI	Schirmer, M.	1986
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	45	1998 C	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	4		D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Lampetra fluviatilis	1099	4		1993 A	D27	NI		1978
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	10	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Leucorrhinia pectoralis	1042	5			D27	NI	eigene Erhebungen	
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	15	1998 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Lutra lutra	1355	7		1993 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	27	10		D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1		D27	NI	Niedersächsisches	1999
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		1	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Lebende Hochmoore	7110		10	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-950	Wümmeniederung mit Walle, Beeke und Wieste	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1998 B	D27	NI	Gemeinde Ottersberg	1993
2820-952	Lehmkuhle Otterstedt	Triturus cristatus	1166	9		1998 A	D27	NI	Schneider-Höke, D.	1985
2820-952	Lehmkuhle Otterstedt	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1998 B	D27	NI	Schneider-Höke, D.	1985
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Apium repens	1614	1	100	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Cobitis taenia	1149	3		1993 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Ophiogomphus cecilia	1037	3		1995	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	8	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	30	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	40	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	17	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	11	1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Moorwälder	91D0	12	80	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	14	30	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	20	1999 A	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	19	5	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Lebende Hochmoore	7110		4	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2821-994	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1999 B	D27	NI	Niedersächsisches	1999
2822-951	Luhner Holz (Weichel) und Stellmoor mit Teich	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	79	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2822-951	Luhner Holz (Weichel) und Stellmoor mit Teich	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	4	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2822-951	Luhner Holz (Weichel) und Stellmoor mit Teich	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	16	6	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Cottus gobio	1163	2		1994	D27	NI	Niedersächsisches	1999

2823-951	Veerse	Ophiogomphus cecilia	1037	4	1996	D27	NI	eigene Erhebungen	
2823-951	Veerse	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	6 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Lampetra planeri	1096	5	1993	D27	NI	Staatliches Amt für Wasser und	1993
2823-951	Veerse	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	10	17 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	16	7 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-951	Veerse	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-955	Fintau und Ruschwede	Cottus gobio	1163	3	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2823-955	Fintau und Ruschwede	Ophiogomphus cecilia	1037	5	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2823-955	Fintau und Ruschwede	Lampetra planeri	1096	6	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2823-955	Fintau und Ruschwede	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	3 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-955	Fintau und Ruschwede	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	24	6 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-955	Fintau und Ruschwede	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2823-955	Fintau und Ruschwede	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	D27	NI	eigene Erhebungen	
2823-955	Fintau und Ruschwede	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2920-950	Ottersberger Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	6	1985 A	D27	NI	Bölscher, B.	1985
2920-950	Ottersberger Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	13 1998 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-950	Ottersberger Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	7	1 1998 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-950	Ottersberger Moor	Moorwälder	91D0	19	17 1998 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-950	Ottersberger Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	19	17 1998 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-950	Ottersberger Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1998 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-950	Ottersberger Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3 1998 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2920-954	Pracher Moor mit Teichen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	15	2 1991 C	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-950	Waller Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	14	12 1999 A	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Moorwälder	91D0	20	10 1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	21	8 1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2 1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		3 1999 A	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-950	Waller Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	50 1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Lampetra planeri	1096	7	1999 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	12	1 1999 C	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	13	3 1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Moorwälder	91D0	15	30 1999 A	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Trockene europäische Heiden	4030		3 1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-951	Holtumer Moor mit Auenquellen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	24 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	48 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	12	11 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	12	5 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Lebende Hochmoore	7110		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Moorwälder	91D0		8 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-952	Wünschmoor und Breitenfeldsmoor	Trockene europäische Heiden	4030		24 1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-953	NSG Wolfsgrund	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	2 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-953	NSG Wolfsgrund	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	13	1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-953	NSG Wolfsgrund	Trockene europäische Heiden	4030		11 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-953	NSG Wolfsgrund	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-954	Fuchsberg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	14	24 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-955	Im Hegeholz W Eversen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	18	20 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-956	Ahausener Bach (Mühlenteich bis Mündung)	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	2 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-956	Ahausener Bach (Mühlenteich bis Mündung)	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-956	Ahausener Bach (Mühlenteich bis Mündung)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2921-956	Ahausener Bach (Mühlenteich bis Mündung)	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-957	Borstgrasrasen und Postmoor bei Posthausen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	9	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-957	Borstgrasrasen und Postmoor bei Posthausen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	10	7	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-957	Borstgrasrasen und Postmoor bei Posthausen	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	13	13	1991	D27	NI	eigene Erhebungen	
2921-957	Borstgrasrasen und Postmoor bei Posthausen	Trockene europäische Heiden	4030		14	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2921-958	Spanger Holz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	7	45	1999 B	D27	NI	Nds. Forstamt Rotenburg	1999
2922-950	Wedeholz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	1	200	1999 A	D27	NI	Campe, U. (Hrsg.)	in
2922-951	Rodau und Hasselbach	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	4	50	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	<i>Lampetra planeri</i>	1096	8		1993	D27	NI	Staatliches Amt für Wasser und	1993
2922-951	Rodau und Hasselbach	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	9	25	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	3	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	14	1	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	15	10	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-951	Rodau und Hasselbach	Moorwälder	91D0		2	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	<i>Myotis bechsteini</i>	1323	1	4	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2922-952	Wiedau und Trochelbach	<i>Myotis myotis</i>	1324	1	4	1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	2	60	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	5	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1037	6		1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	8	25	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	<i>Lampetra planeri</i>	1096	9		1992	D27	NI	Staatliches Amt für Wasser und	1993
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	10	19	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Moorwälder	91D0	16	30	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	19	9	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	20	14	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2922-952	Wiedau und Trochelbach	Lebende Hochmoore	7110		2		D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2923-951	Niederung w Rosebruch	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	10	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2923-951	Niederung w Rosebruch	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	17	6	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2923-951	Niederung w Rosebruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2923-951	Niederung w Rosebruch	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		3	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2923-951	Niederung w Rosebruch	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		2	1991	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-954	Kirchturm Kirchlinteln	<i>Myotis myotis</i>	1324	2		1998	D27	NI	Schnitter, S.	
3021-955	Lindhoop	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	11	30	1998 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	2	1999 C	D27	NI	Wittig, B.	1999
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	<i>Triturus cristatus</i>	1166	10		1999 A	D27	NI	Maaß, H.-J.	1999
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	15	1	1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1999 C	D27	NI	Wittig, B.	1999
3021-956	Waller Flachteiche und Poggenmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		1	1999 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3022-951	Moortümpel Sehlinger Heide	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	1	1999 B	D27	NI	Landkreis Verden	
3022-951	Moortümpel Sehlinger Heide	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1984	D27	NI	Gemeinde Kirchlintern	1998
3022-951	Moortümpel Sehlinger Heide	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	1999 A	D27	NI	Landkreis Verden	
3022-951	Moortümpel Sehlinger Heide	Trockene europäische Heiden	4030		1	1999 B	D27	NI	Landkreis Verden	
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Moorwälder	91D0	2	195	1990 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Dystrophe Seen und Teiche	3160	6	2	1990 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	13	11	1990 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	20	11	1990 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		1	1990 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-954	Weißes Moor b. Bendingbostel	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1	1990 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3022-955	Großes Holz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	4	70	1999 A	D27	NI	Nds. Forstamt Rotenburg	1999
3022-956	Eitzenbruch	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	23	12	1999 A	D27	NI	Nds. Forstamt Rotenburg	1999
3022-957	Sahlingsloher Forst	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	19	20	1999 B	D27	NI	eigene Erhebungen	
3022-957	Sahlingsloher Forst	<i>Lucanus cervus</i>	1083			1999	D27	NI	eigene Erhebungen	
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	5	10	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	6	54	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Ophiogomphus cecilia	1037	7		1997	D27	NI	eigene Erhebungen	
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Lutra lutra	1355	8		1998	D27	NI	eigene Erhebungen	
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Übergangs- und Schwingrasenmoore	6510	11	19	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	7140	14	9	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	9190	21	5	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	3260		1	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	91E0		4	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-951	Oberlauf der Lehrde (nördl. der K126)	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	6430		1	1989	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	2330	3	1	1998 C	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3150	3	40	1998 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Rhodeus sericeus amarus	3130	3	1	1998 C	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Cobitis taenia	1134	3			D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Misgurnus fossilis	1149	4		1989	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Ophiogomphus cecilia	1145	4		1989	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Lutra lutra	6510	6	50	1998 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Lampetra planeri	1037	8		A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	1355	9		1998 A	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	1096	10		B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	6430		1	1998 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3260		1	1998 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5	1998 C	D27	NI	Wittig, B.	1999
3121-951	Allerniederung mit Lehrde	Tonkuhlen bei Armsen	91F0		6	1998 B	D27	NI	Wittig, B.	1999
3122-951	Tonkuhlen bei Armsen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	3140	1	1	1990 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3122-951	Tonkuhlen bei Armsen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	91E0		1	1992 B	D27	NI	Landkreis Verden	
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	6430		1	1990 B	D27	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Trockene europäische Heiden	9190	2	100	1997 B	D28	HH	eigene Erhebungen	
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	7140	13	8	1994 A	D28	HH	eigene Erhebungen	
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	4030		180	1997 A	D28	HH	eigene Erhebungen	
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	4010		1	1994 B	D28	HH	eigene Erhebungen	
2525-901	NSG Fischbeker Heide	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	7150		1	1994 A	D28	HH	eigene Erhebungen	
2525-994	Buchenwälder in Rosengarten	Triturus cristatus	9110	2	250	1992 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2525-994	Buchenwälder in Rosengarten	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9130	4	1	1992 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2526-950	Pfarrteiche Meckelfeld	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	1166	5		1985 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2526-950	Pfarrteiche Meckelfeld	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	8	30	1992	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2624-950	Emsener Weg bei Hollenstedt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9110	7	32	1991	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2624-950	Emsener Weg bei Hollenstedt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1991	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2625-955	Teilfläche des Stukenwalles	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	12	9	1991 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-951	Weiher E Marxen	Triturus cristatus	1166	6		1985 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2626-953	Stemmbuch W Stelle	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	25	1994	D28	NI	Landkreis Harburg	
2626-953	Stemmbuch W Stelle	Moorwälder	91D0		5	1994	D28	NI	Landkreis Harburg	
2626-956	Ashausener Mühlenbach bei Büllhorn	Lampetra planeri	1096	3		1992 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2626-956	Ashausener Mühlenbach bei Büllhorn	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9160	3	30	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9130	5	1	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	9190		2	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	91E0		2	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-957	Laubwälder bei Scharmbeck	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		3	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-958	Pattenserdicke	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9110	6	40	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-958	Pattenserdicke	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9130	6	1	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2626-958	Pattenserdicke	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	9190		5	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-951	Büsenbachtal	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	6230	9	1	1991 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-951	Büsenbachtal	Trockene europäische Heiden	4010	9	5	1991 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-951	Büsenbachtal	Cottus gobio	4030		38	1991 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-990	Lüneburger Heide		1163	1	0	1995 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2725-990	Lüneburger Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	2	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	0	1995 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-990	Lüneburger Heide	Moorwälder	91D0	1	250	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	60	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	70	1990 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	100	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	1	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Lampetra planeri	1096	2	0	1995 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-990	Lüneburger Heide	Triturus cristatus	1166	2	0	1996 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-990	Lüneburger Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	70	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	1	1988 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	85	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	50	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	1	1990	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	5	1988 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	20	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Trockene europäische Heiden	4030		3000	1990 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2725-990	Lüneburger Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		100	1990 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2725-990	Lüneburger Heide	Lebende Hochmoore	7110		50	1990 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2726-955	Teiche SW Toppenstedt	Triturus cristatus	1166	7		1985 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2726-959	Garlstorfer Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	400	1998 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2726-959	Garlstorfer Wald	Triturus cristatus	1166	8		1198 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2727-950	Wald bei Luhmühlen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	3	1982 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2727-950	Wald bei Luhmühlen	Triturus cristatus	1166	9		1984 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2727-950	Wald bei Luhmühlen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	16	8	1982 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2727-955	Hambornsborg/Gellerser Anfang	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	140	1996 B	D28	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2728-950	Luhe-Oberlauf	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	50	1996 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2826-950	Feuchtgebiet E Evendorf	Triturus cristatus	1166	10		1984 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2826-953	Luhe	Cottus gobio	1163	2		1990	D28	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2826-953	Luhe	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	50	1996	D28	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2826-953	Luhe	Lampetra planeri	1096	4		1990	D28	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2827-950	Lopau	Cottus gobio	1163	3		1990	D28	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2827-950	Lopau	Lampetra planeri	1096	5		1990	D28	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
2827-950	Lopau	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	10	1988 C	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2827-950	Lopau	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	13	6	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2827-950	Lopau	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1988 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Lutra lutra	1355	1		1990	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Ophiogomphus cecilia	1037	1		1997 A	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	310	1999 A	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Unio crassus	1032	1	10	1998 C	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	70	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	15	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	70	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	30	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Cottus gobio	1163	4		1999 A	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	1	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Lampetra planeri	1096	6		1999 A	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	6	5	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	20	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	1	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	20	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	22	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Moorwälder	91D0	12	21	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999

2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Lebende Hochmoore	7110		1		D28	NI	eigene Erhebungen	
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Margaritifera margaritifera	1029			1998 C	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Triturus cristatus	1166			1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2829-994	Ilmenau mit Nebenbächen	Trockene europäische Heiden	4030		100	1999 B	D28	NI	Niedersächsisches	1999
2830-950	Neetzeniederung südlich Dahlenburg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	50	1996 B	D28	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2830-950	Neetzeniederung südlich Dahlenburg	Lampetra planeri	1096	7		B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-950	Neetzeniederung südlich Dahlenburg	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	2	1996 B	D28	NI	Landkreis Lüneburg	1996
2830-951	NSG Kleine Göhrde	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	25	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-951	NSG Kleine Göhrde	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	14	5	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-951	NSG Kleine Göhrde	Trockene europäische Heiden	4030		2	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-990	Breaser Grund (Göhrde)	Lucanus cervus	1083	1	0	1992 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-990	Breaser Grund (Göhrde)	Osmoderma eremita	1084	1	0	1992 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2830-990	Breaser Grund (Göhrde)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	35	1992 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2830-990	Breaser Grund (Göhrde)	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	30	1992 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2830-990	Breaser Grund (Göhrde)	Trockene europäische Heiden	4030		34	1992 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2831-950	Mosebusch bei Dragahn	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	50	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2831-950	Mosebusch bei Dragahn	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		5	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-950	Stichter See	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	4	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-950	Stichter See	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	8	1989 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-950	Stichter See	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	10	11	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-950	Stichter See	Trockene europäische Heiden	4030		1	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-951	Höpen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	11	1989 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-951	Höpen	Trockene europäische Heiden	4030		69	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	3	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	22	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	20	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	10	1	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Trockene europäische Heiden	4030		4	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2924-952	Großes Moor	Moorwälder	91D0		4	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	52	1988 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	4	86	1988 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	13	A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		8	1998 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Trockene europäische Heiden	4030		220	1988 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2926-950	Rehrhofer Heide und Raubkammer	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1988 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	180	1999 C	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	87	1999 C	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	4	30	1993	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Lampetra planeri	1096	8		1999	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Moorwälder	91D0	10	30	1993 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2929-950	Ilmenau mit Nebenbächen (Ergänzung)	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	1	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		120	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		10	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2928-950	Schwienau mit Arendorfer Moor	Triturus cristatus	1166			1999	D28	NI	eigene Erhebungen	
2929-953	Mührgehege bei Oetzendorf	Triturus cristatus	1166	1	1382	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2929-953	Mührgehege bei Oetzendorf	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2929-990	Lohn	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	150	1986 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
2929-990	Lohn	Triturus cristatus	1166	3	0	1981 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2931-950	Hoher Mechtin bei Gülden	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	50	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2931-950	Hoher Mechtin bei Gülden	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3023-990	Grundloses Moor	Moorwälder	91D0	2	235	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3023-990	Grundloses Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	5	1989 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3023-990	Grundloses Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	5	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	

3023-990	Grundloses Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		5	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	5	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	130	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Lutra lutra	1355	2			D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	70	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Dystrophe Seen und Teiche	3160	6	1	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	30	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	11	1	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Moorwälder	91D0	13	20	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Lebende Hochmoore	7110		8	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Triturus cristatus	1166			1983	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3026-994	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Trockene europäische Heiden	4030		1360	1988	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3030-950	Berghofwald	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	1	3	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3030-950	Berghofwald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	3	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3030-952	Droher Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	25	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3030-952	Droher Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	15	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3122-990	Vehmsmoor	Moorwälder	91D0	3	200	1989 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3122-990	Vehmsmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	20	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3124-952	Witte Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	31	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3124-952	Witte Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	7	7	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3124-952	Witte Moor	Lebende Hochmoore	7110		25	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3124-952	Witte Moor	Trockene europäische Heiden	4030		1	1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3124-994	Böhme	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	125	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Ophiogomphus cecilia	1037	2		1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	15	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Lutra lutra	1355	3		1995	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	55	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Cottus gobio	1163	5		1995	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	9	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	18	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Lampetra planeri	1096	9		1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	10	4	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	11	10	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Moorwälder	91D0	11	25	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	12	1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Trockene europäische Heiden	4030		10	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Lebende Hochmoore	7110		1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3124-994	Böhme	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		3	1992	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3125-990	Großes Moor bei Becklingen	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	230	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3125-990	Großes Moor bei Becklingen	Moorwälder	91D0	5	65	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3125-990	Großes Moor bei Becklingen	Trockene europäische Heiden	4030		2	1989 C	D28	NI	eigene Erhebungen	
3126-950	Hermannsburger Gehege	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	1	1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	12	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Trockene europäische Heiden	4030		90	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3126-950	Hermannsburger Gehege	Lebende Hochmoore	7110		1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-950	Hermannsburger Gehege	Moorwälder	91D0		1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Cobitis taenia	1149	1		1995	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	40	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Misgurnus fossilis	1145	1		1982	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	80	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Ophiogomphus cecilia	1037	3		1997	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Lutra lutra	1355	4		1998	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	5	25	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Cottus gobio	1163	6			D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Lampetra planeri	1096	10			D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	13	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Trockene europäische Heiden	4030		25	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Moorwälder	91D0		5	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Lebende Hochmoore	7110		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3126-994	Örtze mit Nebenbächen	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3127-950	Unterlüß	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	3	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-950	Unterlüß	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	10	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-950	Unterlüß	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	14	1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-950	Unterlüß	Trockene europäische Heiden	4030		620	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-950	Unterlüß	Lebende Hochmoore	7110		2	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	45	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Trockene europäische Heiden	4030		270	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		5	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Lebende Hochmoore	7110		2	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		10	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3127-951	Oberohe/Niederohe	Moorwälder	91D0		1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Ophiogomphus cecilia	1037	4		1997	D28	NI	Kreisverband der Wasser- und	1997
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	10	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	50	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Cottus gobio	1163	7		1997	D28	NI	Kreisverband der Wasser- und	1997
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	10	1997 B	D28	NI	Kreisverband der Wasser- und	1997
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	20	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Lampetra planeri	1096	11		1997	D28	NI	Kreisverband der Wasser- und	1997
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		1	1997 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1997 C	D28	NI	Kreisverband der Wasser- und	1997
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Moorwälder	91D0		5	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3128-950	Hardautal mit Räberspring	Trockene europäische Heiden	4030		1	1997 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-950	Wierener Berge	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	2	1	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-950	Wierener Berge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	15	9	1998 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-950	Wierener Berge	Trockene europäische Heiden	4030		1	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-950	Wierener Berge	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-950	Wierener Berge	Moorwälder	91D0		1	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Unio crassus	1032	2		1995	D28	NI	eigene Erhebungen	

3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	30	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	6	50	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	1	1998	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Dystrophe Seen und Teiche	3160	7	1	1999	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	<i>Cottus gobio</i>	1163	8		1998	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	<i>Lampetra planeri</i>	1096	12		1998	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-951	Oberlauf der Ilmenau, Stederau-Aue	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	13	10	1998 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-952	Feuchtwälder bei Kallenbrock	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	3	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3129-952	Feuchtwälder bei Kallenbrock	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	8	40	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3129-952	Feuchtwälder bei Kallenbrock	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1988	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3129-990	Bullenkuhle	<i>Triturus cristatus</i>	1166	4	0	1985 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3129-990	Bullenkuhle	Dystrophe Seen und Teiche	3160	8	1	1988 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-990	Bullenkuhle	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden	5130		1	1988 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3129-990	Bullenkuhle	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1988 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3130-951	Luronium-Teich bei Bockholt	<i>Luronium natans</i>	1831	1		1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3130-951	Luronium-Teich bei Bockholt	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3226-950	Wildeck	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	20	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-950	Wildeck	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	3	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-950	Wildeck	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	11	3	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-950	Wildeck	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-950	Wildeck	Trockene europäische Heiden	4030		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-950	Wildeck	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-990	Bornriethmoor	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	2	0	1983 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3226-990	Bornriethmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	130	1989 C	D28	NI	eigene Erhebungen	
3226-990	Bornriethmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	5	25	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3226-990	Bornriethmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	11	10	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3226-990	Bornriethmoor	Lebende Hochmoore	7110		10	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3227-950	Bohlenbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	140	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-950	Bohlenbruch	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1986	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	10	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> [Dünen	2310	4	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	9	1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	10	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	14	6	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Moorwälder	91D0	15	12	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Lebende Hochmoore	7110		7	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Trockene europäische Heiden	4030		4	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		2	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-951	Aschauteiche	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1989	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-990	Breites Moor	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	3	0	1985 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3227-990	Breites Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	9	18	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3227-990	Breites Moor	Lebende Hochmoore	7110		3	1989 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3227-990	Breites Moor	Moorwälder	91D0		5	1989	D28	NI	eigene Erhebungen	
3228-950	Großer Kain	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	30	1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	Moorwälder	91D0	4	75	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	63	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	6	25	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	15	6	1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3229-950	Schweimker Moor und Lüderbruch	Trockene europäische Heiden	4030		1	1987 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3328-950	Hegmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	7	2	1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-950	Hegmoor	Moorwälder	91D0	9	35	1987 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-950	Hegmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	12	10	1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-950	Hegmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		1	1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3329-950	Bruno	Moorwälder	91D0	7	50	1987 A	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3329-950	Bruno	Lampetra planeri	1096	13	1992	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3329-950	Bruno	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Misgurnus fossilis	1145	2	1991 B	D28	NI	Bahlo, K.	1991
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	14 1994 B	D28	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	8	2 1986 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	28 1994	D28	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	14 1986 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Lampetra planeri	1096	14	1989 B	D28	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3329-951	Schwarzwasser von Dedelsdorf bis Meesenmoor	Moorwälder	91D0	14	14 1994 B	D28	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Lampetra planeri	1096	1	12 1989 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	700 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	10 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	90 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	40 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Leucorhinia pectoralis	1042	4	1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Moorwälder	91D0	8	50 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Trockene europäische Heiden	4030		10 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-950	Großes Moor bei Gifhorn	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		1 1989 B	D28	NI	Meineke, T.	1990
3429-951	Ise und Nebengewässer	Cobitis taenia	1149	2	1997 A	D28	NI	Borggräfe, K. & Kölsch, O.	1997
3429-951	Ise und Nebengewässer	Lutra lutra	1355	5	1997 C	D28	NI	Borggräfe, K. & Kölsch, O.	1997
3429-951	Ise und Nebengewässer	Ophiogomphus cecilia	1037	5	1998 A	D28	NI	Pudwill, R.	1998
3429-951	Ise und Nebengewässer	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	14	10 1994 B	D28	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3429-951	Ise und Nebengewässer	Lampetra planeri	1096	15	1997 A	D28	NI	Borggräfe, K. & Kölsch, O.	1997
3429-953	Truppenübungsplatz Wesendorf	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	60 1989	D28	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3430-950	Beverbach	Cobitis taenia	1149	3	1989	D28	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3430-950	Beverbach-	Misgurnus fossilis	1145	3		D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-950	Beverbach	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	10 1999 C	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-950	Beverbach	Dystrophe Seen und Teiche	3160	9	1 1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-950	Beverbach	Lampetra planeri	1096	16	1991	D28	NI	Bahlo, K.	1991
3430-950	Beverbach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2 1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-950	Beverbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1999 B	D28	NI	eigene Erhebungen	
3430-950	Beverbach	Moorwälder	91D0		6 1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-950	Beverbach	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		5 1987 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3430-994	Vogelmoor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	10 1987	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3430-994	Vogelmoor	Luronium natans	1831	2	1983	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3430-994	Vogelmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	15 1987	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3430-994	Vogelmoor	Moorwälder	91D0	6	55 1987	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3430-994	Vogelmoor	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	7	20 1987	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3430-994	Vogelmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	20 1987	D28	NI	Niedersächsisches	1999
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Myotis bechsteini	1323	1	1994	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	10 1994 C	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Cobitis taenia	1149	4	1989 B	D28	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Misgurnus fossilis	1145	4	1989	D28	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	15 1994 C	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	50 1994 B	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	3 1999 C	D28	NI	eigene Erhebungen	
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	14	10 1994 B	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	15	1 1994 C	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Lampetra planeri	1096	17	1991 B	D28	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1994 C	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-950	Kleine Aller / Ehraer Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		2 1994 B	D28	NI	Luckwald, v., G.	1994
3431-951	Kiebitzmoor	Moorwälder	91D0	16	10 1999 A	D28	NI	eigene Erhebungen	
2916-950	Staatsforst Stühe	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	42 1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

2916-950	Staatsforst Stühe	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	1	1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-950	Staatsforst Stühe	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	25	1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-950	Staatsforst Stühe	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-950	Staatsforst Stühe	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-950	Staatsforst Stühe	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	300	1997 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	Osmoderma eremita	1084	2	0	1994 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
2916-990	Hasbruch	Myotis dasycneme	1318	3	0	1996 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	13	15	1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1	1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2916-990	Hasbruch	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1997	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	18	1993 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	115	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Lampetra fluviatilis	1099	1	0	1990 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Lampetra planeri	1096	1	0	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Luronium natans	1831	1	0	1994 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Lutra lutra	1355	2	0	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Triturus cristatus	1166	2	0	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	25	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	3	1	1993	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	7	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	4	8	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	60	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	3	1993 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	13	50	1993 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Moorwälder	91D0	14	30	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	15	17	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3014-990	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	Birken-Moorwald	91D1	10	80	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	Lebende Hochmoore	7110		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3015-950	Huntloser Moor/Großes Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-950	Wehe	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	13	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-950	Wehe	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	18	10	1993 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-950	Wehe	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-950	Wehe	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-951	Dötlinger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	22	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-951	Dötlinger Holz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	2	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3016-951	Dötlinger Holz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Petromyzon marinus	1095	1	1999		D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1			D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Rhodeus sericeus amarus	1134	1			D30	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	108	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Lutra lutra	1355	1	1	1990 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Liparis loeselii	1903	1	1998		D30	NI	Niedersächsisches	1998
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	196	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Cobitis taenia	1149	1	1992		D30	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Cottus gobio	1163	2			D30	NI	Gaumert, D. & Kämmereit, M.	1993
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	40	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Lampetra fluviatilis	1099	2	1999		D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Myotis bechsteini	1323	2			D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Myotis myotis	1324	2			D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	95	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999

3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Luronium natans	1831	3	1993	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Triturus cristatus	1166	3	1999 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Myotis dasycneme	1318	4		D30	NI	eigene Erhebungen	
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	22 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	5 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	7	1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	8	1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Birken-Moorwald	91D1	17	13 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Trockene europäische Heiden	4030		42 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120		2 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Lebende Hochmoore	7110		1 1993 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		4 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-950	Huntetal Dümmer - Oldenburg	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-952	Standortübungsplatz N Harpstedt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	58 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-952	Standortübungsplatz N Harpstedt	Trockene europäische Heiden	4030		1 1993 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Unio crassus	1032	1	100 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Lampetra planeri	1096	2	0 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	7	35 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	4 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	25 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		10 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3017-990	Delmetal nördlich Harpstedt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3018-951	Leerßer Schlatt	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	1 1990 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3018-951	Leerßer Schlatt	Triturus cristatus	1166	4	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3019-950	Waldgebiet bei Gut Falkenburg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	19	8 1999 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3019-950	Waldgebiet bei Gut Falkenburg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	24	6 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3019-950	Waldgebiet bei Gut Falkenburg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		5 1999 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3019-994	Amphibienbiotop Friedeholz Schlatt	Triturus cristatus	1166	5	1995 B	D30	NI	Jahn, P.	1995
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	0 1994 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	2000 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	60 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	460 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	15 1997 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	95 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	4	1 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1997 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3110-990	Tinner Dose, Sprakeler Heide	Trockene europäische Heiden	4030		270 1997 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3113-950	Hövel	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	49 1994 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3114-950	Cappelner Bruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	21 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3114-950	Cappelner Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	18	9 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3114-950	Cappelner Bruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	21	7 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Cottus gobio	1163	1	0 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Lampetra planeri	1096	3	0 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	5 1994 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	4 1994 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	20 1994 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		1 1994	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5 1994 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Birken-Moorwald	91D1		5 1994 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3115-990	Bäken der Endeler u. Holzhauser Heide	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		5 1994 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3117-950	Wälder im Dünsener Bachtal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	40 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3117-950	Wälder im Dünsener Bachtal	Birken-Moorwald	91D1		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3117-950	Wälder im Dünsener Bachtal	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		2	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3117-950	Wälder im Dünsener Bachtal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3118-954	Lindschlag	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	17	11	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3118-954	Lindschlag	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3118-955	Ebersheider Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	19	10	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3118-955	Ebersheider Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		2	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3118-956	Gattau	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	15	12	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3118-956	Gattau	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3118-956	Gattau	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		3	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3119-950	Syker Hache-Tal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	110	1994 A	D30	NI	Ingenieur-Dienst-Nord (IDN)	1994
3119-950	Syker Hache-Tal	Lampetra planeri	1096	4		1994 A	D30	NI	Ingenieur-Dienst-Nord (IDN)	1994
3119-950	Syker Hache-Tal	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		2	1990	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-950	Syker Hache-Tal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1990	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-951	Borsteler Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	10	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3119-951	Borsteler Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	23	6	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3119-951	Borsteler Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	25	6	1998 B	D30	NI	PLANGERECHT	1998
3119-952	Marschbruch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	11	16	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-952	Marschbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	6	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-952	Marschbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-953	Vilsa-Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	16	12	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-953	Vilsa-Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	19	6	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3119-953	Vilsa-Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	24	6	1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3209-994	Ems	Aspius aspius	1130	1		1995	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	5	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Misgurnus fossilis	1145	1		1995	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	800	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	130	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Alosa fallax	1103	1		1990	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Ästuarien	1130	1	1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	10	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Unio crassus	1032	2		1990	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	2		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Rhodeus sericeus amarus	1134	2		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	180	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Cobitis taenia	1149	2		1995	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Cottus gobio	1163	3		1995	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Lampetra fluviatilis	1099	3		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Lutra lutra	1355	3		1989	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	50	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	8	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Luronium natans	1831	4		1996	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	4	55	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Lucanus cervus	1083	4		1980	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3209-994	Ems	Triturus cristatus	1166	6		1985	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	8	1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	45	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	20	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Moorwälder	91D0	12	55	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	14	20	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	14	10	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		20	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		20	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		110	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Lebende Hochmoore	7110		1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3209-994	Ems	Castor fiber	1337			1998	D30	NI	Niedersächsisches	1999

3210-950	Dörgener Moor	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	5	5 1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3210-950	Dörgener Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	15	5 1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3210-950	Dörgener Moor	Moorwälder	91D0	16	18 1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3210-950	Dörgener Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		5 1994 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3214-950	Tenstedter Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	120 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3214-950	Tenstedter Bruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3214-950	Tenstedter Bruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3214-951	Harmer Holz	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	3	10 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3214-951	Harmer Holz	Luronium natans	1831	5	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3214-951	Harmer Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	16	16 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3214-951	Harmer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		2 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3215-950	Waldbereiche um Gut Vardel	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	19	10 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3215-950	Waldbereiche um Gut Vardel	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	20	10 1993 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3215-950	Waldbereiche um Gut Vardel	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3215-950	Waldbereiche um Gut Vardel	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3216-951	Freeseholz und Herrenholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	111 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3216-951	Freeseholz und Herrenholz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	50 1998	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3216-951	Freeseholz und Herrenholz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	16	12 1993 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3216-951	Freeseholz und Herrenholz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2 1993 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3216-951	Freeseholz und Herrenholz	Birken-Moorwald	91D1		1 1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	5 1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Moorwälder	91D0	1	276 1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	88 1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	819 1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Triturus cristatus	1166	7	1997	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	9	1 1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Trockene europäische Heiden	4030		13 1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3217-950	Nördliches Wietingsmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1 1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3218-994	Klosterbachtal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	75 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3218-994	Klosterbachtal	Moorwälder	91D0	8	100 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3218-994	Klosterbachtal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3218-994	Klosterbachtal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3218-994	Klosterbachtal	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3218-994	Klosterbachtal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3220-950	Ortschaft Brücken	Myotis myotis	1324	1	70 1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Lampetra planeri	1096	5	1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Triturus cristatus	1166	8	1999 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	4 1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2 1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Moorwälder	91D0		1 1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5 1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3220-953	Blenhorster-/Kreuzbachniederung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4 1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3221-951	Ortschaft Eystrup	Myotis myotis	1324	3	1999 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3221-952	Teiche Gandesbergen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	5 1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3221-952	Teiche Gandesbergen	Triturus cristatus	1166	9	1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3221-952	Teiche Gandesbergen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	9	1 1996 B	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3306-950	Denne u. Umgebung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	23	6 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-950	Denne u. Umgebung	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-950	Denne u. Umgebung	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-950	Denne u. Umgebung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-950	Denne u. Umgebung	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		3 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-952	Vechte-Altarm Volzel	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	6 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-952	Vechte-Altarm Volzel	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1988 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3306-954	Coevorden-Piccardie-Kanal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	20	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3306-954	Coevorden-Piccardie-Kanal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3308-951	Georgsdorfer Moor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	195	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3308-951	Georgsdorfer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	1950	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3308-951	Georgsdorfer Moor	Birken-Moorwald	91D1	7	105	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3308-951	Georgsdorfer Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	63	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3308-951	Georgsdorfer Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3310-994	Untere Haseniederung	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	30	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	45	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	40	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	60	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Cobitis taenia	1149	3		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Lutra lutra	1355	4		1992	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	2	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	4	1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140	4	20	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Luronium natans	1831	6		1991 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	35	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Castor fiber	1337			1998 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Moorwälder	91D0		5	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		18	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3310-994	Untere Haseniederung	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		20	1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Cerambyx cerdo	1088	1		1998	D30	NI	eigene Erhebungen	
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	177	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Leucorrhinia pectoralis	1042	3		1991	D30	NI	Schreiber, M. & Wellingshorst, R.	1991
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	1	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Lucanus cervus	1083	5		1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Lampetra planeri	1096	6		1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Moorwälder	91D0	6	125	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140	7	13	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	8	30	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	161	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Lebende Hochmoore	7110		1	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3311-951	Börsteler Wald und vorgelagerte Moore	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3313-950	Hase - Wrau	Cobitis taenia	1149	4		1999	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3313-950	Hase - Wrau	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Misgurnus fossilis	1145	2		1996	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	12	1995 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Cobitis taenia	1149	5		1996	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Triturus cristatus	1166	10		1993	D30	NI	Fischer, C.	1994
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3313-951	Neu Hammerstein/Kleine Hase	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Osmoderma eremita	1084	1	1	1983	D30	NI	eigene Erhebungen	
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	80	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	50	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	20	1993 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1999 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1999 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3314-950	Burgwald Dinklage, Bockhorster Moor	Birken-Moorwald	91D1		3	1999 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	1033	1994	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3315-951	Aschener/Heeder Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	70	1994	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	9	15	1994	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Lebende Hochmoore	7110		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3	1994	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Moorwälder	91D0		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3315-951	Aschener/Heeder Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3316-950	Boller Moor und Lange Lohe	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	17		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3316-950	Boller Moor und Lange Lohe	Moorwälder	91D0		1		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3316-950	Boller Moor und Lange Lohe	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-950	Sulinger Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	4		1998	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-950	Sulinger Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	10	16	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-950	Sulinger Moor	Moorwälder	91D0	13	31	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-950	Sulinger Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	14	45	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-950	Sulinger Moor	Lebende Hochmoore	7110		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-950	Sulinger Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-950	Sulinger Moor	Trockene europäische Heiden	4030		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-950	Sulinger Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-950	Sulinger Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	5		1998	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	6	1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	17	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-952	Siedener Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	421	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-952	Siedener Moor	Moorwälder	91D0	11	57	1989	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3319-952	Siedener Moor	Trockene europäische Heiden	4030		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Lebende Hochmoore	7110		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3319-952	Siedener Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3320-951	Oyler Berg	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	1	1	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3320-951	Oyler Berg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	20	7	1996 A	D30	NI	Campe, U.	(in
3320-951	Oyler Berg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	22	7	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3320-951	Oyler Berg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	23	7	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3320-951	Oyler Berg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3320-953	Ortschaft Binnen	Myotis dasycneme	1318	2	46	1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3321-952	Düsterer See	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	11	12	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-952	Düsterer See	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	3	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-952	Düsterer See	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-954	Nienburger Bruch	Myotis bechsteini	1323	3		1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3321-954	Nienburger Bruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	14	20	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-954	Nienburger Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1996 B	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-954	Nienburger Bruch	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		2	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-954	Nienburger Bruch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		3	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3406-954	Großer Zwannenberg	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3406-954	Großer Zwannenberg	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	5	1	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3406-954	Großer Zwannenberg	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3406-954	Großer Zwannenberg	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-951	Fettpott und Umgebung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	21	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-951	Fettpott und Umgebung	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	8	1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-951	Fettpott und Umgebung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3407-951	Fettpott und Umgebung	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	18	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	9	1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Trockene europäische Heiden	4030		3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3407-954	Wilsumer Berge/Hopfenbachtal	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3409-950	Krähenbeerendüne Wachendorf	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	3	1988 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3409-950	Krähenbeerendüne Wachendorf	Trockene europäische Heiden	4030		7	1988 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3411-951	Pottebruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	65	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3411-951	Pottebruch	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	9	27	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3411-951	Pottebruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	13	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3411-951	Pottebruch	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	<i>Coenagrion mercuriale</i>	1044	2		1984	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	<i>Cottus gobio</i>	1163	4		1996 A	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	<i>Lampetra planeri</i>	1096	7		1996 A	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	40	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	14	13	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-951	Eggermühlenbach/Reitbach	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1987 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-952	Maiburg, Dorfwiesen Bippen	<i>Lucanus cervus</i>	1083	1	500	1985 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-952	Maiburg, Dorfwiesen Bippen	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	21	10	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-952	Maiburg, Dorfwiesen Bippen	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		5	1991 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-952	Maiburg, Dorfwiesen Bippen	Birken-Moorwald	91D1		2	1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	<i>Cobitis taenia</i>	1149	6		1996	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	Dystrophe Seen und Teiche	3160	7	1	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	<i>Lampetra planeri</i>	1096	8		1996	D30	NI	Jockwitz, C.	1996
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110		4	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-953	Tütinger Feld/Suttruper Bach	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	<i>Cottus gobio</i>	1163	5		1996	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	<i>Cobitis taenia</i>	1149	7		1996	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	<i>Lampetra planeri</i>	1096	9		1996	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		4	1987 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-954	Haffwiesen, Fienenmoor und Kolkrieder Bach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1997 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-955	Dalumer Holz	<i>Lucanus cervus</i>	1083	2	100	1985 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-955	Dalumer Holz	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	9	1	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-955	Dalumer Holz	<i>Lampetra planeri</i>	1096	10		1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3412-955	Dalumer Holz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	26	5	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-955	Dalumer Holz	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-955	Dalumer Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		4	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3412-955	Dalumer Holz	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		4	1991	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-950	Heidemore bei Druchhorn	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	6		1993	D30	NI	eigene Erhebungen	
3413-950	Heidemore bei Druchhorn	Dystrophe Seen und Teiche	3160	8	1	1987	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-950	Heidemore bei Druchhorn	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1994	D30	NI	Fischer, C.	1994
3413-950	Heidemore bei Druchhorn	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1987 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-954	Reservebecken Alfsee	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	1	1987 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-954	Reservebecken Alfsee	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	4	10	1987 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-954	Reservebecken Alfsee	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	21	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3413-954	Reservebecken Alfsee	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3414-950	Artlandbäche-Südost	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	3		1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-950	Artlandbäche-Südost	<i>Cobitis taenia</i>	1149	8		1999	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-950	Artlandbäche-Südost	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3414-950	Artlandbäche-Südost	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	1	350	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	4	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3414-952	Dammer Berge	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	5	1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	<i>Lucanus cervus</i>	1083	6		1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		2	1999 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3414-952	Dammer Berge	Trockene europäische Heiden	4030		4	1999 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3414-952	Dammer Berge	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		3	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3415-951	Dümmer	<i>Apium repens</i>	1614	1		1996 B	D30	NI	Daniels, J. & Hallen, A.	1996
3415-951	Dümmer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	1320	1990 C	D30	NI	IBL	1990
3415-951	Dümmer	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	4		1998	D30	NI	Belting, H., Naturschutzstation	1999
3415-951	Dümmer	<i>Lutra lutra</i>	1355	5		1990 C	D30	NI	Binner, U. & Reuther, C.	1996
3415-951	Dümmer	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	5	1990 C	D30	NI	IBL	1990
3415-951	Dümmer	<i>Cobitis taenia</i>	1149	9		1997 B	D30	NI	IBL Umweltplanung	1997
3415-951	Dümmer	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	15	20	1991 C	D30	NI	Döring-Mederake, U.	1991
3415-951	Dümmer	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		20	1996 B	D30	NI	Daniels, J. & Hallen, A.	1996
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	10	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	6	1	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	8	49	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	196	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	15	10	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Moorwälder	91D0	18	12	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		98	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-900	Oppenweher Moor, Hochmoor mit Grünland in	Trockene europäische Heiden	4030		10	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3416-991	Oppenweher Moor	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	2	0	1986 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3416-991	Oppenweher Moor	Birken-Moorwald	91D1	3	160	1987 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3416-991	Oppenweher Moor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	7	1	1987 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3416-991	Oppenweher Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	150	1987 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3416-991	Oppenweher Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	12	10	1987 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3416-991	Oppenweher Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1987 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3417-950	Rehdener Geestmoor	Moorwälder	91D0	2	250	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-950	Rehdener Geestmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	19	1999	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-950	Rehdener Geestmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	670	1999	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-950	Rehdener Geestmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	6	70		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-950	Rehdener Geestmoor	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	7		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-950	Rehdener Geestmoor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	9	1	1999 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3417-950	Rehdener Geestmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	16	10		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-950	Rehdener Geestmoor	Lebende Hochmoore	7110		1		D30	NI	eigene Erhebungen	
3417-950	Rehdener Geestmoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-950	Rehdener Geestmoor	Trockene europäische Heiden	4030		11		D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-994	Neustädter Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	1	683	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-994	Neustädter Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	2	35	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Empetrum</i>	2320	2	3	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	87	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3417-994	Neustädter Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	1230	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	8		1992	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	Moorwälder	91D0	9	100	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	10	1	1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3417-994	Neustädter Moor	Trockene europäische Heiden	4030		38	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3418-950	Bleckriede	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	6	19	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Moorwälder	91D0	4	137	1995 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und	2330	5	8	1995 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	9	37	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	<i>Leucorhinia pectoralis</i>	1042	9		1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	12	93	1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	18	9	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1995	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Lebende Hochmoore	7110		1	1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3419-951	Hohes Moor bei Kirchdorf	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		7	1995 A	D30	NI	eigene Erhebungen	

3420-950	Altarme Dunk	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	4	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3420-950	Altarme Dunk	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1996 B	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3420-950	Altarme Dunk	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		1	1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3420-950	Altarme Dunk	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1996 A	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3420-950	Altarme Dunk	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1996	D30	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3506-950	Wolsterbachtal	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	20	1998 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3506-950	Wolsterbachtal	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	11	1	1998 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	18	13	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	25	6	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3507-950	Dinkelniederung südl. Neuenhaus	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3507-952	Overeschhoek/Nordbecks Mühle	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-952	Overeschhoek/Nordbecks Mühle	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	13	11	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-952	Overeschhoek/Nordbecks Mühle	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-953	Grünland NE Getelo	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	7	2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-953	Grünland NE Getelo	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3507-953	Grünland NE Getelo	Trockene europäische Heiden	4030		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	6	1	1988	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	7	2	1988	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	7	3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	9	5	1988	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	10	15	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	10	1	1988	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	11	15	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	14	2	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	16	16	1988	D30	NI	Niedersächsisches	1998
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Triturus cristatus	1166			1992	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Trockene europäische Heiden	4030		339	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-950	Engdener Wüste/Hesepeler Feld	Lebende Hochmoore	7110		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	15	2	1988 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	24	6	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999 C	D30	NI	Bezirksregierung Weser-Ems	1999
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		7	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-952	Brandlechter Vechtetal/Tillenberge	Trockene europäische Heiden	4030		4	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-953	Vechte-Altarme Hesepe	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	13	3	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3508-953	Vechte-Altarme Hesepe	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3510-950	Wald bei Messingen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	25	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3510-950	Wald bei Messingen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1988	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3511-900	Bachniederungen mit Anteilen von Moor - und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	69	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3511-900	Bachniederungen mit Anteilen von Moor - und	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	6	4	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3511-900	Bachniederungen mit Anteilen von Moor - und	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		8	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3513-950	Thiener Mühlenbach	Dystrophe Seen und Teiche	3160	10	1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Lampetra planeri	1096	11		1995	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Moorwälder	91D0		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1997	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-950	Thiener Mühlenbach	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3513-951	Gehn	Triturus cristatus	1166	1	125	1997 A	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	2	1	1997 A	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Osmoderma eremita	1084	2		1997 A	D30	NI	OLOS	1997

3513-951	Gehn	Lucanus cervus	1083	3	27	1997 A	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	4	130	1997	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	3	1997	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	22	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	13	1	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	17	11	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3	1997 A	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		1	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Moorwälder	91D0		1	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3513-951	Gehn	Trockene europäische Heiden	4030		1	1997 B	D30	NI	OLOS	1997
3514-950	Nonnenbach / Ellhornbach	Cobitis taenia	1149	10		1999	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-950	Nonnenbach / Ellhornbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	4	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-950	Nonnenbach / Ellhornbach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	26	6	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3514-950	Nonnenbach / Ellhornbach	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-953	Hohe Hase	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	5	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-953	Hohe Hase	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-953	Hohe Hase	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		2	1987 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-954	Darnsee	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	1	1999 C	D30	NI	Gregarek, S. & A. Vogel	2000
3514-954	Darnsee	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	14	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-954	Darnsee	Moorwälder	91D0		1	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3514-955	Wittefeld	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		55	1998 A	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	8	2	1998 B	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	11	1	1998 B	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	12	1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3514-955	Wittefeld	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	16	4	1998 C	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	7	1998 A	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1998 B	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-955	Wittefeld	Trockene europäische Heiden	4030		6	1998 B	D30	NI	Naturschutzbund Osnabrück e.	1999
3514-956	Randbereiche des Großen Moores	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	600	1995 B	D30	NI	NABU Osnabrück	1997
3514-956	Randbereiche des Großen Moores	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	13	26	1995 B	D30	NI	NABU Osnabrück	1997
3514-956	Randbereiche des Großen Moores	Birken-Moorwald	91D1	15	28	1995 B	D30	NI	NABU Osnabrück	1997
3514-956	Randbereiche des Großen Moores	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3514-957	Eichenreihen am Vördener Damm	Lucanus cervus	1083	4	12	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3514-957	Eichenreihen am Vördener Damm	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	2000 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3516-900	Buchenwaldausprägungen Stemweder Berg,	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	103	1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3516-900	Buchenwaldausprägungen Stemweder Berg,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	6	48	1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3516-901	Tiefenriede bei Drohne	Coenagrion mercuriale	1044	1	10	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3516-901	Tiefenriede bei Drohne	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	12	3	1994	D30	NW	eigene Erhebungen	
3516-950	Stemweder Berge	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	160	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3516-950	Stemweder Berge	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	120	1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3516-950	Stemweder Berge	Lucanus cervus	1083	7		1993 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Misgurnus fossilis	1145	5		1990	D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Cobitis taenia	1149	11		1990	D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Moorwälder	91D0		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Trockene europäische Heiden	4030		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-900	(Feucht)Grünland, Heidereste, Kleine Aue Hinternfelde	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	4		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	2		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit	Moorwälder	91D0		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3517-903	Heideweiher NSG-Schnakenpohl mit	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3518-900	Eichen-und(Hain)Buchenwälder, Wickriede Osterwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	84		D30	NW	eigene Erhebungen	
3518-900	Eichen-und(Hain)Buchenwälder, Wickriede Osterwald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	23		D30	NW	eigene Erhebungen	

3518-900	Eichen-und(Hain)Buchenwälder, Wickriede Osterwald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	7	D30	NW	eigene Erhebungen	
3518-900	Eichen-und(Hain)Buchenwälder, Wickriede Osterwald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	21	7	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	53 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	16 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	13	3 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Moorwälder	91D0	19	12 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		22 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3519-900	Mittelweser mit Staustufe Schlüsselburg, Haverner	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		18 1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3520-950	Ortschaft Diethe	Myotis dasycneme	1318	1	50 1998 A	D30	NI	eigene Erhebungen	
3608-951	Rolinks Tannen	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	12	1 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-951	Rolinks Tannen	Trockene europäische Heiden	4030		1 1995 B	D30	NI	Landkreis Graftschaft Bentheim	1998
3608-952	Syen Venn	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	33 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3608-952	Syen Venn	Moorwälder	91D0	5	130 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	6	5 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	10	4 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	13	10 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	15	38 1988 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	6440		1	D30	NI	eigene Erhebungen	
3608-952	Syen Venn	Lebende Hochmoore	7110		2 1988 C	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-952	Syen Venn	Trockene europäische Heiden	4030		1	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-990	Berger Keienvenn	Luronium natans	1831	2	0 1990 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3609-990	Berger Keienvenn	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	4 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-990	Berger Keienvenn	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-991	Ahlder Pool	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	2	1 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-991	Ahlder Pool	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	4	6 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-991	Ahlder Pool	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	8	1 1988 C	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-991	Ahlder Pool	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3609-991	Ahlder Pool	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1988 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3610-994	Gutswald Stovern	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	92 1999 A	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3610-994	Gutswald Stovern	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	4 1999 B	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3610-994	Gutswald Stovern	Triturus cristatus	1166		1999	D30	NI	Niedersächsisches	1999
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	2	12 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	3	1 1999 B	D30	NW	Gregarek, S. & A. Vogel	2000
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	3 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Myotis bechsteini	1323	4	1990	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	21 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Luronium natans	1831	7	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	9	1 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Leucorrhinia pectoralis	1042	10	1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	12	12 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	14	9 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	17	15 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Moorwälder	91D0	20	12 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		18 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3611-900	Heiliges Meer, Erdfallsee und Heideweiher	Trockene europäische Heiden	4030		9 1996	D30	NW	eigene Erhebungen	
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	15 1987 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	4 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	17	10 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	20	10 1999 B	D30	NI	eigene Erhebungen	
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2 1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Triturus cristatus	1166		1997 B	D30	NI	eigene Erhebungen	

3613-950	Truppenübungsplatz Achmer	Trockene europäische Heiden	4030		7	1987 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3615-954	Fellage	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	21	1986 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3615-954	Fellage	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	22	9	1986 A	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3615-954	Fellage	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1	1986 B	D30	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3616-901	Auenbereiche des Großen Dickfußes, Waldparzelle	Misgurnus fossilis	1145	6		1991	D30	NW	eigene Erhebungen	
3616-901	Auenbereiche des Großen Dickfußes, Waldparzelle	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1989	D30	NW	eigene Erhebungen	
3616-901	Auenbereiche des Großen Dickfußes, Waldparzelle	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1989	D30	NW	eigene Erhebungen	
3618-900	Von Bachläufen durchzogene Eichenwälder im	Myotis bechsteini	1323	1	10	1987	D30	NW	eigene Erhebungen	
3618-900	Von Bachläufen durchzogene Eichenwälder im	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	68		D30	NW	eigene Erhebungen	
3618-900	Von Bachläufen durchzogene Eichenwälder im	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	22	7		D30	NW	eigene Erhebungen	
3618-900	Von Bachläufen durchzogene Eichenwälder im	Moorwälder	91D0		2		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	85		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	12	16		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Moorwälder	91D0		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1		D30	NW	eigene Erhebungen	
3619-901	Laubwälder mit Bachläufen im Heisterholz	Triturus cristatus	1166				D30	NW	eigene Erhebungen	
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Cobitis taenia	1149	1		1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Cottus gobio	1163	1		1995	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Lampetra planeri	1096	1		1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Lutra lutra	1355	1		1998	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Ophiogomphus cecilia	1037	1		1997	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Triturus cristatus	1166	1		1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	76	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	45	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	2	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	42	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	60	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	6	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	50	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	31	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Moorwälder	91D0	11	50	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	33	10	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Trockene europäische Heiden	4030		3	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Margaritifera margaritifera	1029				D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Lebende Hochmoore	7110		3	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		5	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2328-994	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
2917-950	Stemmer Holz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	25	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2917-950	Stemmer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	28	25	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	15	1993 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	2	1991 B	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum	2320	1	4	1993 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	51	1993 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	211	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	3	2	1993 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	2	1993 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Moorwälder	91D0	16	11	1993 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	18	9	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
2918-951	Steller Heide/Siekwiesen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Alosa fallax	1103	1		1991 A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Rhodeus sericeus amarus	1134	1		1991 A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991

3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Cobitis taenia	1149	3	1991	A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991	
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Lampetra planeri	1096	3	1991	A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991	
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	1	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	6	64	1991	B	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	3	1991	A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	4	1991	A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1999	A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3018-950	Klosterbachtal Heiligenrode-Mackenstedt	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1991	A	D31	NI	Gemeinde Stuhr	1991
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Aspius aspius	1130	1	1990			D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Misgurnus fossilis	1145	1	1990	A		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1	1990			D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Rhodeus sericeus amarus	1134	2	1990			D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Triturus cristatus	1166	2	1995			D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Ophiogomphus cecilia	1037	2	1998	A		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	60	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	1	1990	C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	1	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	15	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1990		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		1	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3021-953	Weserniederung zwischen Bremen u. Allermündung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1990		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3120-950	Hägerdorn	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	26	28	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3120-950	Hägerdorn	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-950	Höpen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	7	13	1999	B	D31	NI	Forstamt Erdmannshausen	1999
3121-950	Höpen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	25	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-950	Höpen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	20	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-950	Höpen	Moorwälder	91D0	18	7	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3121-950	Höpen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1999	C	D31	NI	Forstamt Erdmannshausen	1999
3121-952	Stedebergen	Triturus cristatus	1166	3	1988			D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	200	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Lucanus cervus	1083	1	1995			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	1400	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	30	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Cottus gobio	1163	2	1980			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	1	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	4	20	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	4	1	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Lampetra planeri	1096	4	1982			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	1	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Moorwälder	91D0	8	115	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	3	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	14	15	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Lebende Hochmoore	7110		30	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3124-995	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz	Trockene europäische Heiden	4030		1500	1989		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3223-950	Fledermausquartier Ahlden	Myotis myotis	1324	2	1999			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	5	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	740	1990	C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	730	1990	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Myotis bechsteini	1323	1				D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Myotis dasycneme	1318	1				D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	160	1990	B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	2	1 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	100 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	3 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Lutra lutra	1355	2	1998	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	5 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	65 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Misgurnus fossilis	1145	2		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Aspius aspius	1130	2		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Cottus gobio	1163	3		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Leucorrhinia pectoralis	1042	3	1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Myotis myotis	1324	3		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Ophiogomphus cecilia	1037	3	1995	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Rhodeus sericeus amarus	1134	3		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	20 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	5 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Cobitis taenia	1149	4		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Triturus cristatus	1166	4	1991	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Lampetra planeri	1096	5		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	9	15 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	10	15 1990 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	65 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Moorwälder	91D0	17	10 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		1 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Hartholzauenenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		75 1990 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		1 1990 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		10 1990 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Castor fiber	1337		1998	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3223-994	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	Trockene europäische Heiden	4030		1 1990	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Luronium natans	1831	1		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	5 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	35 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Myotis bechsteini	1323	2		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Myotis dasycneme	1318	2		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	250 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Lutra lutra	1355	3	1998	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Misgurnus fossilis	1145	3	1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Moorwälder	91D0	3	350 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	760 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Ophiogomphus cecilia	1037	4	1993	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Rhodeus sericeus amarus	1134	4		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	4	1997	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	20 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Triturus cristatus	1166	5		D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Lampetra planeri	1096	6	1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	20	8 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Lebende Hochmoore	7110		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3224-994	Meißendorfer Teiche, Ostenhozer Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3321-950	Hohe Horst / Sündern	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	1	12 1996 A	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-950	Hohe Horst / Sündern	Myotis bechsteini	1323	3	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3321-950	Hohe Horst / Sündern	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	20 1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-950	Hohe Horst / Sündern	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	9 1996 A	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-950	Hohe Horst / Sündern	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1 1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	4	1 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	10	1 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	9 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996

3321-951	Schwarzes Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	12	2 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Moorwälder	91D0		5 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Trockene europäische Heiden	4030		1 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3321-951	Schwarzes Moor	Lebende Hochmoore	7110		1 1996 A	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	28 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	1 1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	5	1 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	70 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Moorwälder	91D0	15	16 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Lebende Hochmoore	7110		2 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2 1996 A	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3322-950	Lichtenmoor	Trockene europäische Heiden	4030		43 1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3323-950	Suderbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	20	50 1991 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3323-950	Suderbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2 1991 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Myotis bechsteini	1323	4	1999	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	8 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Rhodeus sericeus amarus	1134	5	1999	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	5	1997	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	25 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Ophiogomphus cecilia	1037	5	1993	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	7 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Triturus cristatus	1166	6	1999	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	7	1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	13	1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	13	12 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Moorwälder	91D0	14	20 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Lebende Hochmoore	7110		1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Trockene europäische Heiden	4030		12 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3324-950	Erweiterung Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3326-950	Entenfang Boye	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	2 1999 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3326-950	Entenfang Boye	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	35 1989 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3326-950	Entenfang Boye	Moorwälder	91D0		2 1989 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	10 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	11	13 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Lebende Hochmoore	7110		2 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Trockene europäische Heiden	4030		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3327-950	Am Aschenberg	Turloughs	3180		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	142 1994 B	D31	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Ophiogomphus cecilia	1037	6	1989	D31	NI	Altmüller et al.	1989
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Lampetra planeri	1096	7	1989 B	D31	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	33 1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	3 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	5 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	29	24 1994 A	D31	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3328-953	Wiehe von der Mündung bis Pollhöfen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1989	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	3	30	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Cottus gobio	1163	4			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	8	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Leucorrhinia pectoralis	1042	6		1992	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Ophiogomphus cecilia	1037	7		1993	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	8	1	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Lampetra planeri	1096	8			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	2	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Moorwälder	91D0	12	50	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Lebende Hochmoore	7110		1	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Trockene europäische Heiden	4030		60	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		1	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3329-994	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3421-990	Rehburger Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	1	0	1991 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3421-990	Rehburger Moor	Moorwälder	91D0	4	330	1988 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3421-990	Rehburger Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	430	1988 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3421-990	Rehburger Moor	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	5	1	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3421-990	Rehburger Moor	Trockene europäische Heiden	4030		7	1988 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Moorwälder	91D0	2	650	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	530	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	6	20	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Leucorrhinia pectoralis	1042	7		1979	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Lebende Hochmoore	7110		60	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3423-994	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3425-950	Walbeck	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	2	1998 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3425-950	Walbeck	Cobitis taenia	1149	5		1997 A	D31	NI	ALG (AG Limnologie und	
3425-950	Walbeck	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	8	1999 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3425-950	Walbeck	Lampetra planeri	1096	9		1997 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3425-950	Walbeck	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3	1998 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3425-990	Trunnenmoor	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	7	1987 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3425-990	Trunnenmoor	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	3	1	1987 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3425-990	Trunnenmoor	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	8	19	1987 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3425-990	Trunnenmoor	Moorwälder	91D0	10	67	1987 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3425-990	Trunnenmoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1987 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3426-950	Wathlinger Forst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	65	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3426-950	Wathlinger Forst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	35	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3426-950	Wathlinger Forst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	195	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	43	1994 B	D31	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	8	1986 C	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	43	1994 B	D31	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	Moorwälder	91D0	9	86	1994 B	D31	NI	Landkreis Gifhorn	1994
3428-952	Schwarzwasser von der Mündung bis Rohrbruch	Lampetra planeri	1096	10		1989 B	D31	NI	Arbeitsgruppe Fließgewässer	1989
3520-901	Abschnitt der Gehle mit östlich angrenzenden	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	9	1		D31	NW	eigene Erhebungen	
3520-901	Abschnitt der Gehle mit östlich angrenzenden	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	34	8		D31	NW	eigene Erhebungen	
3520-901	Abschnitt der Gehle mit östlich angrenzenden	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2		D31	NW	eigene Erhebungen	
3520-901	Abschnitt der Gehle mit östlich angrenzenden	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1		D31	NW	eigene Erhebungen	
3520-951	Fuldetal/Sündern	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	48	1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3520-951	Fuldetal/Sündern	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	3	1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3520-951	Fuldetal/Sündern	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	13	6	1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3520-951	Fuldetal/Sündern	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140		1	1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3520-951	Fuldetal/Sündern	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1996	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3520-951	Fuldetal/Sündern	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1999	D31	NI	eigene Erhebungen	
3521-950	Wildes Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	27	1996 A	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996

3521-950	Wildes Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	10	12	1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3521-950	Wildes Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4	1996 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3521-951	Fulde	<i>Cobitis taenia</i>	1149	6		1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3521-951	Fulde	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1999	D31	NI	eigene Erhebungen	
3521-951	Fulde	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		1	1999	D31	NI	eigene Erhebungen	
3521-952	Rehburger Berge	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	8	21	1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3521-952	Rehburger Berge	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	10	3	1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3521-952	Rehburger Berge	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	30	21	1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3521-952	Rehburger Berge	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		5	1996 B	D31	NI	Landkreis Nienburg (Weser)	1996
3521-953	Wald bei Poll	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	11	10	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3521-953	Wald bei Poll	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	24	35	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3521-954	Wölpinghauser Berg	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	3	30	1998 A	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-954	Wölpinghauser Berg	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	5	40	1998 A	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-954	Wölpinghauser Berg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	31	15	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3521-954	Wölpinghauser Berg	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3521-954	Wölpinghauser Berg	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3521-955	Salzstelle nördlich Wiedenbrügge	Salzwiesen im Binnenland	1340	2	1	1998	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-958	Düdinghärser Berg	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	2	54	1998	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-959	Hagenburger Holz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	1	120	1998	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-959	Hagenburger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	260	1998	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-959	Hagenburger Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	6	60	1998	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3521-994	Steinhuder Meer	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1099	1			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	100	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	890	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	4			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten	7210	4	1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Moorwälder	91D0	5	230	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1134	6			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	<i>Cobitis taenia</i>	1149	7			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	7	20	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	8	50	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3521-994	Steinhuder Meer	Lebende Hochmoore	7110		1	1989	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	1300	1999 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	<i>Myotis dasycneme</i>	1318	3		1998	D31	NI	Ökologische Schutzstation	1998
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	<i>Myotis myotis</i>	1324	4		1998	D31	NI	Ökologische Schutzstation	1998
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> [Dünen	2310	4	13	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	3	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und	2330	5	1	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	1	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Moorwälder	91D0	6	180	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	<i>Triturus cristatus</i>	1166	7		1998 A	D31	NI	Ökologische Schutzstation	1998
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1999 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Trockene europäische Heiden	4030		5	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		1	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-951	Steinhuder Meer (Erweiterung)	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		15	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	30		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	8	4		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	3		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Lebende Hochmoore	7110		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-952	Hellern/Wieckenberg	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		3		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3524-950	Wiesenbachtal b. Isernhagen	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	5	1998 B	D31	NI	Gruber, D.	1995
3524-950	Wiesenbachtal b. Isernhagen	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	9	40	1995 B	D31	NI	Gruber, D.	1995
3524-950	Wiesenbachtal b. Isernhagen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	32	15	1998 B	D31	NI	Gruber, D.	1995
3524-950	Wiesenbachtal b. Isernhagen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1998 B	D31	NI	Gruber, D.	1995
3524-951	Wälder im Umfeld der Auter	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	24	1990 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3524-951	Wälder im Umfeld der Auter	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	25	34	1990 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-950	Kugelfangtrift und Standortübungsplatz Nord	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	8	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-950	Kugelfangtrift und Standortübungsplatz Nord	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	1	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-950	Kugelfangtrift und Standortübungsplatz Nord	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1999	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-950	Kugelfangtrift und Standortübungsplatz Nord	Trockene europäische Heiden	4030		2	1999 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-951	Oldhorster Moor	Moorwälder	91D0	7	152	1998 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-951	Oldhorster Moor	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	9	18	1998 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-951	Oldhorster Moor	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	11	10	1998 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Moorwälder	91D0	1	840	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	2	50	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten	7210	5	1	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	6	1	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	70	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	8	1983		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	<i>Triturus cristatus</i>	1166	8	1998	B	D31	NI	ALAND	1996
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	10	25	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	10	15	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	120	1998 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3525-952	Altwarmbüchener Moor/Misburger Wald/Ahlteener Wald	Lebende Hochmoore	7110		1	1998 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	11		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	19	9		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		5		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-950	Bruchbach bei Gut Hustedt	Moorwälder	91D0		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	125	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	12	20	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	13	2	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> ,	91F0		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3526-951	Schilfbruch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3527-994	Amphibienbiotop nördl. Plockhorst	<i>Triturus cristatus</i>	1166	9		B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3528-950	Schweineholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	800	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3528-950	Schweineholz	Hainsimons-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	8	11	1986	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	2	0	1985 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> [Dünen	2310	2	28	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	6	1	1986 C	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	6	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	5	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Übergangs- und Schwinggrasenmoore	7140	14	6	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Moorwälder	91D0		1	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3528-990	Fahle Heide, Gifhorner Heide	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1986 B	D31	NI	eigene Erhebungen	
3529-951	Tankumsee	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	10	1999 A	D31	NI	Pudwill, R.	1998
3530-950	Rabenberg bei Wolfsburg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	180	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3530-950	Rabenberg bei Wolfsburg	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	12	10	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3530-950	Rabenberg bei Wolfsburg	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	21	6	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3530-950	Rabenberg bei Wolfsburg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3530-951	Allersee	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	2	10	1999	D31	NI	Pudwill, R.	1998
3531-994	Drömling	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	1	145	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	85	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Luronium natans</i>	1831	2		1983	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Coenagrion mercuriale</i>	1044	3		1984	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Lutra lutra</i>	1355	4		1997	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	4	200	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Misgurnus fossilis</i>	1145	5		1982	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1134	7		1993	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1037	8			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	9		1984	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Triturus cristatus</i>	1166	10			D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Moorwälder	91D0	13	40	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	55	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Brenndolden-Auenwiesen (<i>Cnidion dubii</i>)	6440		10	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	<i>Castor fiber</i>	1337			1998	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3531-994	Drömling	Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> ,	91F0		10	1988	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3620-900	Wälder mit westl. angrenzendem Gehle-Bachabschnitt	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	4	22		D31	NW	eigene Erhebungen	
3620-900	Wälder mit westl. angrenzendem Gehle-Bachabschnitt	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	14	6		D31	NW	eigene Erhebungen	
3620-900	Wälder mit westl. angrenzendem Gehle-Bachabschnitt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	27	26		D31	NW	eigene Erhebungen	
3620-900	Wälder mit westl. angrenzendem Gehle-Bachabschnitt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2		D31	NW	eigene Erhebungen	
3620-950	Hiddensener Wäldchen	<i>Myotis bechsteini</i>	1323	5		1998	D31	NI	eigene Erhebungen	
3620-950	Hiddensener Wäldchen	<i>Myotis myotis</i>	1324	5		1998	D31	NI	eigene Erhebungen	
3620-950	Hiddensener Wäldchen	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		2	1995	D31	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3620-953	Schaumburger Wald	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	1	584	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3620-953	Schaumburger Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	290	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3620-953	Schaumburger Wald	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	4	61	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3620-953	Schaumburger Wald	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	12	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3620-953	Schaumburger Wald	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1987	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3624-953	Eilenriede Süd	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	13	10	1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-953	Eilenriede Süd	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	100	1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-953	Eilenriede Süd	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-953	Eilenriede Süd	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		1	1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-954	Eilenriede	<i>Cerambyx cerdo</i>	1088	1		1995	D31	NI	eigene Erhebungen	
3624-954	Eilenriede	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	100	1987	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3625-950	Flakenbruch bei Lehrte	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	9	30	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3625-950	Flakenbruch bei Lehrte	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	23	45	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3626-950	Hainwald bei Hämelerwald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	53	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3625-950	Flakenbruch bei Lehrte	Moorwälder	91D0		1	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-950	Schwarzwasser-Niederung	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	5	80	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-952	Meerdorfer Holz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	4	42	1988 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-952	Meerdorfer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	84	1988 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-952	Meerdorfer Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	15	14	1988 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-953	Fuhse-Niederung	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	5	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-953	Fuhse-Niederung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	14	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-953	Fuhse-Niederung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	5	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-953	Fuhse-Niederung	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	17	11	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-953	Fuhse-Niederung	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		1	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-954	Woltorfer Holz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	2	100	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3627-954	Woltorfer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	21	50	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3629-950	Sundern	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	120	1986 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3629-950	Sundern	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130		1	1986 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3629-951	Dibbesdorfer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	180	1988	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1984	D31	NI	Niedersächsisches	1999

3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	620	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	3	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	35	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Leucorrhinia pectoralis	1042	10		1994	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	12	10	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3629-994	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1986	D31	NI	Niedersächsisches	1999
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Myotis myotis	1324	1	1	1999	D31	NI	eigene Erhebungen	
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Cerambyx cerdo	1088	2			D31	NI	eigene Erhebungen	
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	7	1	1986 B	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	170	1986 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Barbastella barbastellus	1308		6	1999 A	D31	NI	eigene Erhebungen	
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		3	1986 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-950	Beienroder Holz und Kampstüh	Triturus cristatus	1166			1982	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	6	14		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	8	1		D31	NI	eigene Erhebungen	
3630-951	Mittlere Schunter	Leucorrhinia pectoralis	1042	11		1993	D31	NI	eigene Erhebungen	
3630-951	Mittlere Schunter	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	12	13		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	16	14		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	19	52		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Moorwälder	91D0		4		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3630-951	Mittlere Schunter	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1		D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3631-950	Steinbrink bei Rickensdorf	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	22	50	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3631-950	Steinbrink bei Rickensdorf	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130		1	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-950	Weddeler Wohld	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	235	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-950	Weddeler Wohld	Turloughs	3180		1	1979 A	D31	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	20	1992 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	1	2	1992 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	5	1992 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	Triturus cristatus	1166	1		1985	D32	NI	Baudezernat Stadt	1995
3522-950	Mergelgrube Kolenfeld	Bombina variegata	1193			1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3525-953	Erweiterung Bockmerholz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	25	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-953	Erweiterung Bockmerholz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	10	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3525-953	Erweiterung Bockmerholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	20	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3621-950	Stadthagen	Myotis myotis	1324	1		1998	D32	NI	eigene Erhebungen	
3621-951	Beckedorfer Kirche	Myotis myotis	1324	2		1998	D32	NI	eigene Erhebungen	
3621-952	Ottenser Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	120	1998	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-952	Ottenser Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	447	1998	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-953	Hülse	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	50	1995	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-954	Flothbach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	25	1995	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-955	Vornhäger Bach	Cottus gobio	1163	1		1995	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-955	Vornhäger Bach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	50	1995	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3621-958	Brand bei Niengraben	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	12	1987 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3621-958	Brand bei Niengraben	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	45	1987 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3622-950	Haster Wald	Myotis bechsteini	1323	1			D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3622-952	Rodenberger Aue	Cottus gobio	1163	2		1998	D32	NI	Landkreis Schaumburg	1998
3622-952	Rodenberger Aue	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	10	1995	D32	NI	Landkreis Schaumburg	
3622-953	Munzeler Mark	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	110	1995	D32	NI	Baudezernat Stadt	1995
3622-953	Munzeler Mark	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	10	5	1995	D32	NI	Baudezernat Stadt	1995
3622-954	Haster Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	1	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3622-954	Haster Holz	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	1	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3622-954	Haster Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	55	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3622-954	Haster Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	1	255	1998 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	1	1998 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	109	1998 C	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Kalkreiche Niedermoore	7230	4	1	1999 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	1	1998 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	21	1998 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-950	Lößbördenwälder am Kirchwehren	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	7	1998 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-952	Flakenbruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	30	1998 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-952	Flakenbruch	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	4	5	1998 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-952	Flakenbruch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	40	1998 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3623-954	Binnensalzstelle Empelde	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	2	1999 A	D32	NI	eigene Erhebungen	
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	2	100	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	5	1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	1	1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	26	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-950	Lößbördenwälder an der Ihme	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	20	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-951	Alte Leine	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	91	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-951	Alte Leine	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	22	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-951	Alte Leine	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	4	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-951	Alte Leine	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		3	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-951	Alte Leine	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140		17	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-952	Jeinser Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	100	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-952	Jeinser Holz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	10	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3624-952	Jeinser Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3625-951	Mergelgrube Teutonia Süd	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	2	3	1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-951	Mergelgrube Teutonia Süd	Triturus cristatus	1166	2		1998 A	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-951	Mergelgrube Teutonia Süd	Kalkreiche Niedermoore	7230	3	6	1999 A	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-953	Mergelgrube HPC I	Kalkreiche Niedermoore	7230	2	8	1999 A	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-953	Mergelgrube HPC I	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	2	1	1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-953	Mergelgrube HPC I	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	3	1	1999 B	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-953	Mergelgrube HPC I	Triturus cristatus	1166	3		1998 A	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	720	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Maculinea nausithous	1061	1		1999	D32	NI	eigene Erhebungen	
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	1	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	10	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	3	1	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Triturus cristatus	1166	4		1985	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3625-994	Bockmerholz, Gaim	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130		2	1987	D32	NI	Niedersächsisches	1999
3626-990	Hahnenkamp	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	36	1988 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3626-990	Hahnenkamp	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	10	1988 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3626-990	Hahnenkamp	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	6431		1	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-950	Stamstorfer Holz	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	3	25	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-950	Stamstorfer Holz	Kalkreiche Niedermoore	7230	5	1	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-950	Stamstorfer Holz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	9	6	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-950	Stamstorfer Holz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	4	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-950	Stamstorfer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	10	1999 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3724-952	Harsumer Holz, Borsumer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	101	1987	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-950	Klein Lafferder Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	60	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-951	Lengeder Teiche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	106	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-951	Lengeder Teiche	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		1	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-952	Wälder bei Bettmar	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	50	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-952	Wälder bei Bettmar	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	10	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-952	Wälder bei Bettmar	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	95	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3727-952	Wälder bei Bettmar	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1988	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3728-950	Denstorfer Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	5	28	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-950	Denstorfer Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	12	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-951	Gleidlinger Holz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	20	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-951	Gleidlinger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	20	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-952	Sonnenburger Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	7	21	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-952	Sonnenburger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	9	1986 B	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3824-950	Hallerburger Holz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	6	22	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3824-950	Hallerburger Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	88	1986	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3827-951	Berelries	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	3	41	1978 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3827-951	Berelries	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	41	1978 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3828-950	Beddingen Holz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	1	70	1979 A	D32	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-953	Geitelder Holz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	4	15	1987	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3728-953	Geitelder Holz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	50	1987	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-950	Herzogsberge bei Cremlingen	<i>Triturus cristatus</i>	1166	4		1997 A	D33	NI	Geldner, J.	1997
3729-951	Mascheroder, Rautheimer, Nieder- u. Oberdahlumer	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	135	1986 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-952	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	7	1999	D33	NI	eigene Erhebungen	
3729-952	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	4	2	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-952	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	7	1	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-952	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	70	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-954	Großes Holz und Veltheimer Forst bei Cremlingen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	200	1987	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-954	Großes Holz und Veltheimer Forst bei Cremlingen	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	8	1	1987	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-954	Großes Holz und Veltheimer Forst bei Cremlingen	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	8	1	1987	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3729-955	Salzstelle bei Salzdaßlum	Salzwiesen im Binnenland	1340	2	1	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	1	20	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	2	40	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Galio-Carpinetum</i>	9170	2	1	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	60	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	1	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-951	Roter Berg und Umgebung	<i>Triturus cristatus</i>	1166	5			D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-951	Roter Berg und Umgebung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		40	A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	12	A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	1	2500	B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	1	125		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	10		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	1	180		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	<i>Triturus cristatus</i>	1166	2	0	1983 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	15		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	100		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i>	9180		200		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210		35		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Trockene europäische Heiden	4030		20		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen	8160		150		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Turloughs	3180		2	1979 A	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		40		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-952	Elm mit Pufferzonen	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		55		D33	NI	eigene Erhebungen	
3730-953	Salzstelle bei Beienrode	Salzwiesen im Binnenland	1340	3	1	1979	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-953	Salzstelle bei Beienrode	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	6	1	1979	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-990	Rieseberg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	90	1986 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-990	Rieseberg	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	7	70	1986 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-990	Rieseberg	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	7	1	1986 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3730-990	Rieseberg	<i>Cypripedium calceolus</i>	1902		0	1992 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3731-950	Dorm	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Galio-Carpinetum</i>	9170	1	39		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3731-950	Dorm	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	1		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3731-950	Dorm	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	6	4		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3731-950	Dorm	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	6	73		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.

3731-950	Dorm	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		1		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3731-950	Dorm	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1		D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3732-951	Lappwald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	1000	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	1000	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Cerambyx cerdo	1088	1		1978	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Myotis bechsteini	1323	1	2	1996 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	100	1990 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	150	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	2	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3732-951	Lappwald	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	50	1990 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	800	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	25	1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3732-951	Lappwald	Triturus cristatus	1166	3	0	199 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		100	1990 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		600	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3732-951	Lappwald	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	9180		800	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-950	Geltwiese/Meltenwiese	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	1	1998 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-950	Geltwiese/Meltenwiese	Triturus cristatus	1166	6		1998 C	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-950	Geltwiese/Meltenwiese	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	7	1	1998 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	100	1985	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	1	3	1994 A	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	40	1994 A	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Kalkreiche Niedermoore	7230	2	1	1994	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	350	1985	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	5	10	1994	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	20	1994 A	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	9180		50	1994 A	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210		7	1994 B	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-951	Asse und Vahlberger Buchen	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		30	1994 A	D33	NI	Randig, W.	1995
3829-952	Oderwald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	80	1995 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-952	Oderwald	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	3	45	1995 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-952	Oderwald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	170	1995 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-952	Oderwald	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	14	1995 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3829-952	Oderwald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	190	1995 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3830-951	Magerrasen Mühlenberg u. "Rottebeek"	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	2	100	1987 B	D33	NI	Bezirksregierung Braunschweig	1987
3830-951	Magerrasen Mühlenberg u. "Rottebeek"	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	3	1987 B	D33	NI	Bezirksregierung Braunschweig	1987
3830-951	Magerrasen Mühlenberg u. "Rottebeek"	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	2	1987 C	D33	NI	Bezirksregierung Braunschweig	1987
3830-952	Lah, Küblinger Trifft und angrenzende Landschaftsteil	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	12	1996 A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3830-952	Lah, Küblinger Trifft und angrenzende Landschaftsteil	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	15	1996 A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3830-952	Lah, Küblinger Trifft und angrenzende Landschaftsteil	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	9180		10	1996 A	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3830-953	Wasservogelreservat Schöppenstedter Teiche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	6	1999 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3830-953	Wasservogelreservat Schöppenstedter Teiche	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	12	1999 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-950	Kiesteich Isingerode	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	35	1996	D33	NI	Landkreis Wolfenbüttel	1996
3929-951	Okertal	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	40	1982	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-951	Okertal	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	80	1982 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-951	Okertal	Myotis myotis	1324	1	0	1997	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-951	Okertal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	11	1985 B	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3929-951	Okertal	Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)	6130		50	1982 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-951	Okertal	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		1	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3929-951	Okertal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		60	1990 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	Triturus cristatus	1166	1	10	1990	D33	NI	eigene Erhebungen	
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	8	1985 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	60	1998 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	4	35	1985 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
3931-951	Heeseberg und Salzwiesen	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen	6110		23	1985 C	D33	NI	eigene Erhebungen	

4128-950	Harly	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	2	1 1999 B	D33	NI	eigene Erhebungen	
4128-950	Harly	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	2 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	2 1984	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	3 1999 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
4128-950	Harly	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	3	1 1999 A	D33	NI	eigene Erhebungen	
4128-950	Harly	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	85 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	1 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	8	1	D33	NI	eigene Erhebungen	
4128-950	Harly	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	1 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	6 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		31 1986 A	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)	6130		1 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
4128-950	Harly	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3 1986	D33	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Lucanus cervus	1083	1	1997 B	D34	NI	eigene Erhebungen	
3608-954	Bentheimer Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	395 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	3	1 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	13	1 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	40	6 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3609-950	Bentheimer Berg	Trockene europäische Heiden	4030		1 1988 C	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3609-950	Bentheimer Berg	Triturus cristatus	1166		1988 B	D34	NI	Schrödter, C.-H.	1988
3609-950	Bentheimer Berg	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		3 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3609-950	Bentheimer Berg	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3609-950	Bentheimer Berg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	38	7 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5 1999 B	D34	NI	Niedersächsisches	1999
3608-954	Bentheimer Wald	gestrichen!!! Atlantischer, saurer Buchenwald mit	9120		100 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3608-954	Bentheimer Wald	Triturus cristatus	1166		1986 B	D34	NI	Schrödter, C.-H.	1988
3609-954	Samerrott	Lucanus cervus	1083	2	1997 A	D34	NI	eigene Erhebungen	
3609-954	Samerrott	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	264 1996 B	D34	NI	Landkreis Grafschaft Bentheim	1998
3609-954	Samerrott	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	15	33 1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	1	15	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Leucorrhinia pectoralis	1042	1		D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Luronium natans	1831	1		D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	4	3	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	74	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	5	1	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	5	15	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	6	13	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	8	1	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	7	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	80	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	9	39	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	10	13	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	24	59	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Flüsse mit Schlammabänken mit Vegetation des	3270		1	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Trockene europäische Heiden	4030		15	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Triturus cristatus	1166			D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		15	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		22	D34	NW	eigene Erhebungen	
3610-900	Gewässersystem Ems und bewaldete	Moorwälder	91D0		3	D34	NW	eigene Erhebungen	
3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	3	100	D34	NW	eigene Erhebungen	
3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		5 1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	Trockene europäische Heiden	4030		27 1996	D34	NW	eigene Erhebungen	

3612-900	Recker Moor/Düsterdieker Niederung/Seester Feld	Moorwälder	91D0		54	1989	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Dytiscus latissimus	1081	1		1976	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Cottus gobio	1163	2		1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Lurionium natans	1831	2		2000	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	3	19	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	1	2000	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Triturus cristatus	1166	6	101	2000	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	9	1	2000	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	10	38	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	10	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	12	5	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Moorwälder	91D0	12	19	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	38	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	27	20	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-900	Rünenberger Venn/Ammerner Mark u. Strönfeld	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		10	1991	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Lampetra planeri	1096	2		1995	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Cottus gobio	1163	3		1990	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	12	9	1989	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	28	20	1989	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	34	8	1989	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-901	Dinkel mit Seitengewässern	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		8	1989	D34	NW	eigene Erhebungen	
3708-950	Weiher Sieringhoek/Golfplatz	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	10	1	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-950	Weiher Sieringhoek/Golfplatz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	14	3	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-950	Weiher Sieringhoek/Golfplatz	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-951	Gerlachsche Fläche	Lurionium natans	1831	3		1999 A	D34	NI	eigene Erhebungen	
3708-951	Gerlachsche Fläche	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	2	1998 B	D34	NI	eigene Erhebungen	
3708-951	Gerlachsche Fläche	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1998 B	D34	NI	Landkreis Graftschaft Bentheim	1998
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	1	1997 C	D34	NI	Gregarek, S. & A. Vogel	2000
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	1	26	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Dytiscus latissimus	1081	2		1976	D34	NI	eigene Erhebungen	
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	2	117	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	3	35	1998 B	D34	NI	Niedersächsisches	1998
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Lurionium natans	1831	4		1999	D34	NI	eigene Erhebungen	
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Birken-Moorwald	91D1	8	25	1998 B	D34	NI	Niedersächsisches	1998
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	5	1997 B	D34	NI	Niedersächsisches	1998
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	35	8	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Trockene europäische Heiden	4030		32	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1988 C	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-952	Gildehauser Venn u. Umgebung	Lebende Hochmoore	7110		1	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-953	Tüschbrook	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	37	38	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3708-953	Tüschbrook	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130		4	1988 B	D34	NI	Niedersächsisches Landesamt	o.J.
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Dystrophe Seen und Teiche	3160	6	1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	11	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	9	5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	11	1		D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Moorwälder	91D0	18	8	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	38	7	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-900	(Rest)Flächen mit Feuchtgrünland, Feuchtheiden	Trockene europäische Heiden	4030		3	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-901	Offlumer Binnendünen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	11	3	199	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-901	Offlumer Binnendünen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	34	12	199	D34	NW	eigene Erhebungen	
3709-901	Offlumer Binnendünen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	199	D34	NW	eigene Erhebungen	

3709-901	Offlumer Binnendünen	Trockene europäische Heiden	4030		3	199	D34	NW	eigene Erhebungen
3709-902	Naturnaher Bachabschnitt der Steinfurter Aa	Cobitis taenia	1149	1			D34	NW	eigene Erhebungen
3709-902	Naturnaher Bachabschnitt der Steinfurter Aa	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	38	7		D34	NW	eigene Erhebungen
3709-902	Naturnaher Bachabschnitt der Steinfurter Aa	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		10		D34	NW	eigene Erhebungen
3709-903	Salzbrunnen am Rothenberg	Salzwiesen im Binnenland	1340	2	1	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	124		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	12	3		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	19	30		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	24	15		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	25	25		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		62		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		1		D34	NW	eigene Erhebungen
3711-901	Emsaue zwischen Greven und Emsdetten	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1		D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	40	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	5		D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Dystrophe Seen und Teiche	3160	1	25	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	1	200	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Moorwälder	91D0	3	36	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	32	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Luronium natans	1831	5		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Trockene europäische Heiden	4030		73	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		183	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3806-900	Moore und Heiden des Westmünsterlandes (Ammeloer	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		37	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-900	Butenfeld	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	2	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-900	Butenfeld	Triturus cristatus	1166	7	101	2000	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-900	Butenfeld	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	13	2	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-900	Butenfeld	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		8	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-900	Butenfeld	Trockene europäische Heiden	4030		3	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-902	Ahauser Aa	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	12	1983	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-902	Ahauser Aa	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	17	42	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-902	Ahauser Aa	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	24	19		D34	NW	eigene Erhebungen
3807-902	Ahauser Aa	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	30	50		D34	NW	eigene Erhebungen
3807-902	Ahauser Aa	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Cobitis taenia	1149	2			D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Lampetra planeri	1096	3		1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Cottus gobio	1163	4			D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	19	5	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3809-900	Vechte mit Seitengewässern	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Lampetra planeri	1096	4			D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Cottus gobio	1163	5			D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	14	34		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	15	1		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	33	12		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	35	12		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	57	14		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		12		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-901	Zwei naturnahe Bachabschnitte: Vechte und	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2		D34	NW	eigene Erhebungen
3809-902	Herrenholz und Schoeppinger Berg	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	134,3	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	2	1	1996 B	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Leucorrhinia pectoralis	1042	2			D34	NW	eigene Erhebungen

3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	4	76	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	9		D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	87	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	39	7	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Moorwälder	91D0		5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		7	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Trockene europäische Heiden	4030		10	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-900	Zu optimierende geschädigte Hochmoor-und	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Myotis bechsteini	1323	2		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Myotis dasycneme	1318	2		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Myotis myotis	1324	2		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	154	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	13	9	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	88	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3810-901	Bagno	Barbastella barbastellus	1308		40	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Leucorrhinia pectoralis	1042	3			D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	6	100		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	12		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	17	25		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	19	29		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	29	19		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Trockene europäische Heiden	4030		1		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-900	Fließgewässersystem der Glane mit naturnahen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		35		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-901	Hanfteich	Luronium natans	1831	6			D34	NW	eigene Erhebungen
3811-901	Hanfteich	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	12	1		D34	NW	eigene Erhebungen
3811-901	Hanfteich	Triturus cristatus	1166			1991	D34	NW	eigene Erhebungen
3811-901	Hanfteich	Trockene europäische Heiden	4030		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Lucanus cervus	1083	3			D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	2		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	9	4		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	29	12		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	37	9		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Trockene europäische Heiden	4030		4		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-900	Sandgebiet mit Binnendünen und Bachläufen bei	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-901	(Feucht)Grünland im Kattenvenn und Waldkomplex im	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	17	32		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-901	(Feucht)Grünland im Kattenvenn und Waldkomplex im	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	36	11		D34	NW	eigene Erhebungen
3812-901	(Feucht)Grünland im Kattenvenn und Waldkomplex im	Triturus cristatus	1166			1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Lampetra planeri	1096	5		1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Cottus gobio	1163	6		1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	20	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	20	30	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	20	21	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Triturus cristatus	1166			1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		7	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-900	Berkel	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	2000	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-902	Croshawick Feld und Croshawick Grenzwald	Luronium natans	1831	8		2000	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-902	Croshawick Feld und Croshawick Grenzwald	Dystrophe Seen und Teiche	3160	11	1	2000	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-902	Croshawick Feld und Croshawick Grenzwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		2	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-902	Croshawick Feld und Croshawick Grenzwald	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-902	Croshawick Feld und Croshawick Grenzwald	Moorwälder	91D0		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	50	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	6	50	1990	D34	NW	eigene Erhebungen

3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Triturus cristatus	1166	8	101	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Moorwälder	91D0	13	19	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	36	8	1988	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		8	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Trockene europäische Heiden	4030		4	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-903	Moore u. Heiden d. Westmünsterlandes Zwillbrocker	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-904	Fürstenbusch	Dystrophe Seen und Teiche	3160	7	1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-904	Fürstenbusch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	14	60	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-904	Fürstenbusch	Moorwälder	91D0		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3906-904	Fürstenbusch	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Dystrophe Seen und Teiche	3160	8	1		D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	10	6	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	13	1		D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	30	18	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	39	7	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
3907-902	Schwattet Gatt	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1		D34	NW	eigene Erhebungen
3909-901	Wald bei Haus Burlo	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	21	21	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3909-901	Wald bei Haus Burlo	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	21	65,1	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3909-901	Wald bei Haus Burlo	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	30	9	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	84		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Triturus cristatus	1166	9	101	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	26	13		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	28	13		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	31	46		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-900	Von Grünland umgebene frische Buchenwälder	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	33		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	33	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Leucorrhinia pectoralis	1042	4		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Moorwälder	91D0	4	33	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Triturus cristatus	1166	4	501		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	5	55	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	99	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	6		D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	26	22	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	29	11	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Trockene europäische Heiden	4030		22	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-902	Münstersche Aa und Nebengewässer, Bockholter	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		22	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-903	Hanseller Floth	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	1	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
3911-903	Hanseller Floth	Triturus cristatus	1166	10	101	2000	D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	77		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Triturus cristatus	1166	5	150		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	70		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	14	2		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	14	1		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	16	6		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	20	28		D34	NW	eigene Erhebungen
3912-900	Abschnitt der Emsaue und Standortübungsplatz	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		22		D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Myotis bechsteini	1323	1	31	2000 B	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Cerambyx cerdo	1088	1		2000 B	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Myotis dasycneme	1318	1	40	2000 A	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Myotis myotis	1324	3		2000 B	D34	NW	
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	2		D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Triturus cristatus	1166	11	101		D34	NW	eigene Erhebungen

3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	14	34	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	27	12	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	31	14	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	40	6	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-901	Alte Hessel, Lai-,Lodden-,Ruthenbach, Tatenhauser	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-902	Feuchtgebiet Vennheide mit Sandforther Bach im	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	30	12	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-902	Feuchtgebiet Vennheide mit Sandforther Bach im	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-902	Feuchtgebiet Vennheide mit Sandforther Bach im	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3915-902	Feuchtgebiet Vennheide mit Sandforther Bach im	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	7	10	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	14	48	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Moorwälder	91D0	19	6	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	31	16	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	42	6	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Triturus cristatus	1166				D34	NW	eigene Erhebungen
3916-900	Vom Foddenbach durchflossenes Waldgebiet	Trockene europäische Heiden	4030		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Misgurnus fossilis	1145	1		1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140	2	40	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	8	33	2000	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Triturus cristatus	1166	12	101	1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	13	5	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Lebende Hochmoore	7110		5	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Moorwälder	91D0		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-900	Fürstenkuhle/Kuhlenvenn	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		5	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4008-901	Gaupeler Mark	Triturus cristatus	1166	1	1800		D34	NW	eigene Erhebungen
4008-901	Gaupeler Mark	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	2	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4008-901	Gaupeler Mark	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	23	60		D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	32	10		D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	58	13	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-900	Empter Mark	Triturus cristatus	1166			1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-901	Baumberge	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	504	1992	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-901	Baumberge	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	2	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4009-901	Baumberge	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	35	8	1992	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-902	Roruper Holz mit Kestenbusch	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	82,1	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-902	Roruper Holz mit Kestenbusch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	11	63,1	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4009-902	Roruper Holz mit Kestenbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	49	25	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Cobitis taenia	1149	3		1986	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	111		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	72		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Triturus cristatus	1166	13	101		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	16	33		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-900	Großer zusammenhängender naturnaher	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Cobitis taenia	1149	4		1986	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	114		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	8	86		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	25	58		D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	27	15		D34	NW	eigene Erhebungen

4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	43	6	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		8	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	D34	NW	eigene Erhebungen
4012-901	Eichen-(Hainbuchen)wälder des Wolbecker	Triturus cristatus	1166			D34	NW	eigene Erhebungen
4013-900	Heidbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	28	52 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-900	Heidbusch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	37	6	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	11	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	33	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Coenagrion mercuriale	1044	4		D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Moorwälder	91D0	10	22	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	13	35	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Triturus cristatus	1166	14	101	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	16	44	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	24	22	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	31	10	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	41	33	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-901	Emslandschaft mit Zulauf des Mussenbaches zw.	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		33	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-902	Averbergsche Teiche und Laubwälder	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	34	43 2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-903	Wald östlich Freckenhorst	Triturus cristatus	1166	2	1001 2000	D34	NW	eigene Erhebungen
4013-904	Wartenhorster Sundern südöstlich von Everswinkel	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	22	62,3 2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Unio crassus	1032	1	1989 A	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Coenagrion mercuriale	1044	2	20 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	2	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	108 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	4	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Lampetra planeri	1096	6	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	43 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	2 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Moorwälder	91D0	11	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Triturus cristatus	1166	15	101	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	16	43 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Trockene europäische Heiden	4030		43 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-900	Emsaue zwischen Warendorf und Bokel	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		43 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-901	Landratsbüsche	Triturus cristatus	1166	3	750 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-902	Sassenberger Brook - Tiergarten	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	18	40	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-902	Sassenberger Brook - Tiergarten	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	40	7 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-902	Sassenberger Brook - Tiergarten	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	41	6 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4014-902	Sassenberger Brook - Tiergarten	Triturus cristatus	1166		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140	10	5 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Moorwälder	91D0		3 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4015-900	Hühnermoor, (feuchte) Laubwaldausprägungen und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	21	21 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	27	16 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	32	16 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		10 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		5 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Moorwälder	91D0		5 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-900	Lutter, Greipen-, Trüggel-, Reiherbach, Rieselfelder	Trockene europäische Heiden	4030		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-, Reck-, Koch-,	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	6	1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-, Reck-, Koch-,	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	23	27 1990	D34	NW	eigene Erhebungen

4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		9	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		5	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,	Triturus cristatus	1166			1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4016-902	Niederungsbereiche: Abrooks-,Reck-,Koch-,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-900	Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	10	3,5	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-900	Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-900	Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-900	Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche	Trockene europäische Heiden	4030		4	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	128	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Moorwälder	91D0	5	31	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	15	30	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	15	48	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	15	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	22	28		D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	31	12	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-901	Auenbereiche von Ölbach und Landerbach, Holter	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		4	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	4	18	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	8	9	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	16	26	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	18	31	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	25	18	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		9	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Moorwälder	91D0		3	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Trockene europäische Heiden	4030		1	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4017-902	Oerlinghauser u. Wistinghauser Senne, Ölbacht	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		2	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	330		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	132	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	360	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	28	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	107	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer	3110	2	4		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	2	120	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	3		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Myotis bechsteini	1323	3			D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Lucanus cervus	1083	4		1998	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Myotis myotis	1324	4			D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	23	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Leucorrhinia pectoralis	1042	5			D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	2	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Cottus gobio	1163	7			D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	7	7	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	7	89	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Lampetra planeri	1096	7			D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	40	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Moorwälder	91D0	9	23	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	73	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	2		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Triturus cristatus	1166	16	101		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	19	28		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		120	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Trockene europäische Heiden	4030		840	1996	D34	NW	eigene Erhebungen

4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Lebende Hochmoore	7110		120	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen	
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Emys orbicularis	1220			1990	A	D34	NW	eigene Erhebungen
4018-900	Truppenübungsplatz Senne	Botrychium simplex	1419		80	1997		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Lampetra planeri	1096	1	3000	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Moorwälder	91D0	1	70	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Cottus gobio	1163	1	5000	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Cobitis taenia	1149	5		1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	42	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	21	28	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	32	14	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	41	6	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		24	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		4	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Trockene europäische Heiden	4030		3	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4018-901	Auenbereiche Ems u.Furlbach / Wehr-u.Rahmkebach,	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	180	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	300	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	4	2000		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	5	2000		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	24	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Dytiscus latissimus	1081	3		1971		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Leucorrhinia pectoralis	1042	6		1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Leucorrhinia pectoralis	1042	7		1992	A	D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	10	2000		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	7	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	9	17	2000		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	14	9	2000		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Moorwälder	91D0	17	10	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	33	10	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Trockene europäische Heiden	4030		240	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		6	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		60	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Triturus cristatus	1166			1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4107-902	Heubachniederung/Schwarzes	Lebende Hochmoore	7110		12	1994		D34	NW	eigene Erhebungen
4109-900	Wildpark Dülmen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	105	1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4109-900	Wildpark Dülmen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	7	1	1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4110-900	Bulderner Feldmark	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	41	7	1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4110-900	Bulderner Feldmark	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	45	29	1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4110-900	Bulderner Feldmark	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2	1990		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-900	Venner Moor	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	7	40	1989		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-900	Venner Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	11	6	1989		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-900	Venner Moor	Moorwälder	91D0	14	17	1989		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-900	Venner Moor	Trockene europäische Heiden	4030		17	1989		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	296	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	483	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	650	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Coenagrion mercuriale	1044	5				D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Moorwälder	91D0	7	25	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	73	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	37	1996		D34	NW	eigene Erhebungen
4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3	1996		D34	NW	eigene Erhebungen

4111-901	Die "Davert" und die "Hohe Ward"	Triturus cristatus	1166		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4112-901	Waldgebiet Brock	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	26	55,2 2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4113-900	Kettelerhorst mit Voßbach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	104 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4113-902	Sundern-Tönnishäuschen incl. Hellbachau N Vorhelm	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	101 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4113-902	Sundern-Tönnishäuschen incl. Hellbachau N Vorhelm	Triturus cristatus	1166		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4113-903	Torcksholz E Vorhelm	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	39	36 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Lucanus cervus	1083	5		D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	82 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	82 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	18	25 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		21 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-901	Bergeler Wald in den Beckumer Bergen	Cypripedium calceolus	1902		1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	216 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	9	64 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	22	21 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		11 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Liparis loeselii	1903		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-902	Geisterholz, Hoerster Berge, Angel	Cypripedium calceolus	1902		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-903	Wälder und Weiher am Pilatusberg	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	23	22 2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4114-903	Wälder und Weiher am Pilatusberg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	43	32,5 2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-900	Ruthenbach, alte (Hain)Buchenwälder Putz,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	34	12 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-900	Ruthenbach, alte (Hain)Buchenwälder Putz,	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	50	24 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-900	Ruthenbach, alte (Hain)Buchenwälder Putz,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	126 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	14	50 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	23	21 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		2 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4115-901	Alte Eichen-(Hain)Buchenwälder Rheda-Wiedenbrück	Moorwälder	91D0		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	11	38 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	17	6 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Moorwälder	91D0	20	6 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	32	10 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		16 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4116-900	Ausgeprägte Tiefland-Fließgewässer-Strukturen	Triturus cristatus	1166			D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Lampetra planeri	1096	8	1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	18	32 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Moorwälder	91D0		2 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4117-901	Feuchtgebiete Erdgarten-Lauerwiesen,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		12 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-901	Kranenmeer	Luronium natans	1831	7		D34	NW	eigene Erhebungen
4207-901	Kranenmeer	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	16	1 2000	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-901	Kranenmeer	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		3 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Dystrophe Seen und Teiche	3160	9	1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Moorwälder	91D0		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4207-903	Wessendorfer Heidemoor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		1 1994	D34	NW	eigene Erhebungen

4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Übergangs- und Schwinggrasensmoore	7140	4	25	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	125	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	25	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	12	50	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Moorwälder	91D0		5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-900	Waldgebiet: Die Haard	Trockene europäische Heiden	4030		5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Cottus gobio	1163	8		1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Leucorrhinia pectoralis	1042	8		1994 A	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Lampetra planeri	1096	9		1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	15	56	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Moorwälder	91D0	16	11	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	18	6	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	19	25	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	28	16	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-901	Wienbach, Middlicher Mühlenbach, Becker Busch,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		7	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-902	Wald, Quellbach, Grünland Schultendille Hohe Mark	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	29	16	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-902	Wald, Quellbach, Grünland Schultendille Hohe Mark	Moorwälder	91D0		1	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-902	Wald, Quellbach, Grünland Schultendille Hohe Mark	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		5	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4208-902	Wald, Quellbach, Grünland Schultendille Hohe Mark	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4209-900	Steuer	Lampetra fluviatilis	1099	1		1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4209-900	Steuer	Cobitis taenia	1149	6		1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4209-900	Steuer	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4209-900	Steuer	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		19	1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4210-900	Sandforter Forst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	89	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4210-900	Sandforter Forst	Myotis myotis	1324	5		1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4210-900	Sandforter Forst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	13	67	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4210-900	Sandforter Forst	Moorwälder	91D0	15	17		D34	NW	eigene Erhebungen
4210-900	Sandforter Forst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	80	1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4211-900	Wälder bei Nordkirchen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	104	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4211-900	Wälder bei Nordkirchen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	20	27	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4212-900	Wald und Grünland bei Heessen	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	9170	1	90	1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4212-900	Wald und Grünland bei Heessen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	152	1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4212-900	Wald und Grünland bei Heessen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	24	20	1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4212-900	Wald und Grünland bei Heessen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	28	12	1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-900	Uentropen Wald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	44	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-900	Uentropen Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	116	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-900	Uentropen Wald	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		29	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	2		D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	5	3	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	31	6	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	44	32	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		5	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Liparis loeselii	1903			1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4213-901	(Hain)Buchenwald und Kalkhalbtrockenrasen am	Triturus cristatus	1166			1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-900	Havixbrock	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	243	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-900	Havixbrock	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	27	11	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	7220	3	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Lucanus cervus	1083	6		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	13	54	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	29	52	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-901	Diestedder Berg mit NSG "Liesen- und Boxelbachtal"	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		26	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Kalkreiche Niedermoore	7230	2	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen

4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	6	3 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		6 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-902	Orchideenreiche Kalksteinbrüche Vellern, Hellbach	Triturus cristatus	1166		1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-903	Önkhaus Berg	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	26	13 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-903	Önkhaus Berg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	42	33 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4214-903	Önkhaus Berg	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		13 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4215-900	Buchenwaldausprägungen mit westlich	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	72 1992	D34	NW	eigene Erhebungen
4215-900	Buchenwaldausprägungen mit westlich	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3 1992	D34	NW	eigene Erhebungen
4215-900	Buchenwaldausprägungen mit westlich	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3 1992	D34	NW	eigene Erhebungen
4215-900	Buchenwaldausprägungen mit westlich	Triturus cristatus	1166			D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Apium repens	1614	1	0 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	1	14 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	70 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	3	1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Cottus gobio	1163	9	1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	22	28 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	46	28 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4216-901	Boker Kanal und NSG Zachariassee	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		42 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Salzwiesen im Binnenland	1340	1	12 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Kalkreiche Niedermoores	7230	3	1 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	90 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	1	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Moorwälder	91D0	6	30 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	45 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	13 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Lampetra planeri	1096	10		D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	30	15 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	32	45 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4217-900	Ausgedehnte Feuchtgebiete des Gewässersystems	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		45 1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Dystrophe Seen und Teiche	3160	10	1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	17	1	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Moorwälder	91D0		1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-900	Heideweiher: NSG Langenbergteich	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-902	Tallwiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-902	Tallwiesen	Coenagrion mercuriale	1044	3	10 1993	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-902	Tallwiesen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4218-904	Tongrube Alte Schanze	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	7 2000 A	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Aspius aspius	1130	1	1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Coenagrion mercuriale	1044	1	150 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	123 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	76 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Lampetra fluviatilis	1099	2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Moorwälder	91D0	2	59 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	43 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Cottus gobio	1163	10	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	39 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	21	30	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	26	18	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		295 1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4307-900	Lippeaue zwischen Hamm und Schermbeck	Triturus cristatus	1166		1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	16	48 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	25	22 1996	D34	NW	eigene Erhebungen

4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	40	36	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		4	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Moorwälder	91D0		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4308-900	Die Burg: Waldkomplex mit Gewässersystem	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	23	24	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110		3	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4309-901	Waldgebiet: Becklemer Busch mit Breitenbrucher Bach	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		2	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4311-900	Cappenberger Wald	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	2	201	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4311-900	Cappenberger Wald	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	38	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4311-900	Cappenberger Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	109	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4311-900	Cappenberger Wald	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	15	47	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4311-900	Cappenberger Wald	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	25	14	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Aspius aspius</i>	1130	2		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	70	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Myotis dasycneme</i>	1318	3		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und	2330	5	21	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	5	65	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	21	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Cobitis taenia</i>	1149	7		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Lampetra planeri</i>	1096	11		1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	26	21	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	28	11	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	30	11	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		105	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Cottus gobio</i>	1163			1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		32	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-901	Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und Glenne	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-902	Sandbochumer Heide	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	29	10	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-902	Sandbochumer Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	33	15	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4312-902	Sandbochumer Heide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	56	15	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4313-900	Geithe	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Galio-Carpinetum</i>	9170	2	60	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4313-900	Geithe	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	160	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4313-900	Geithe	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4313-903	Kuhholz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	87	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4313-903	Kuhholz	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	17	42		D34	NW	eigene Erhebungen
4313-903	Kuhholz	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	19	37		D34	NW	eigene Erhebungen
4313-903	Kuhholz	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	22	19	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-901	Quabbeaue	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	5	1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-901	Quabbeaue	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	36	8	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-901	Quabbeaue	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	37	8	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-901	Quabbeaue	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	51	22	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-902	Bröggel	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	19	75	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-904	Ahsewiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	12	37	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-904	Ahsewiesen	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	18	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4314-904	Ahsewiesen	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1994	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-905	Alpke	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	23	18	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-905	Alpke	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	52	22	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-906	Rosenau	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	33	10		D34	NW	eigene Erhebungen
4314-906	Rosenau	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-906	Rosenau	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4314-906	Rosenau	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	0	1		D34	NW	eigene Erhebungen
4315-900	Woeste	<i>Myotis myotis</i>	1324	1	55	1996	D34	NW	eigene Erhebungen

4315-900	Woeste	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	5 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-900	Woeste	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		9 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-900	Woeste	Triturus cristatus	1166		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-902	Brockbusch	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	21	27 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-902	Brockbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	55	18 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-902	Brockbusch	Triturus cristatus	1166		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	3	7 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	28 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	56 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	20 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	12	56 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Lampetra planeri	1096	12	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Triturus cristatus	1166		1993	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Bombina variegata	1193		1993	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		56 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4315-903	Gieslersystem und Pöppelschetal	Cottus gobio	1163		1993	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	158 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	4	1	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	7	2	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	35	11 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	44	6 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	47	28 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Triturus cristatus	1166		4 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		56 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-900	Stockheimer Bruch, Osterheuland und Geseker Bach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-901	Steinbruch an der Berger Straße	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	8	1 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-901	Steinbruch an der Berger Straße	Triturus cristatus	1166		1995	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-902	Westerschledde	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	285 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-902	Westerschledde	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	7	3 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-902	Westerschledde	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	35	41 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4316-902	Westerschledde	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald	9150		124 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	3	239 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	17	44 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	59	9 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-901	Buchenwälder mit Bachläufen Sammtholz,	Moorwälder	91D0		1 1991	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-902	Prövenholz	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	11	60 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4317-903	Steinbrüche "Auf der Höhe"	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	2	8 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Myotis dasycneme	1318	4	1996 A	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	13	49 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	34	10 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	60	9 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-903	Gysenberger Wald, Volkspark Sodingen und	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3 1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-904	Langeloh-Tal	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	25	17 1988	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-904	Langeloh-Tal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		8 1988	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-904	Langeloh-Tal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1988	D34	NW	eigene Erhebungen
4409-904	Langeloh-Tal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2 1988	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	22	26 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	37	8 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	53	21 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2 1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-900	NSG Dellwiger Bach und Wideybachtal N Westrich	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1 1989	D34	NW	eigene Erhebungen

4410-902	NSG Mengeder Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	39	7	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-903	Bodelschwingher Wald W Schloß Bodelschwingh	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	36	11	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-903	Bodelschwingher Wald W Schloß Bodelschwingh	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-903	Bodelschwingher Wald W Schloß Bodelschwingh	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		8	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	2	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	38	38	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-907	NSG Mastbruch und angrenzende Waldbereiche	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-908	NSG Hallerey	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	29	1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-908	NSG Hallerey	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1989	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-909	Holthäuser Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	140		D34	NW	eigene Erhebungen
4410-909	Holthäuser Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	36	41	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-909	Holthäuser Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-909	Holthäuser Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4410-909	Holthäuser Tal, Dortmunder Stadtwald, NSG "Auf dem	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4411-900	NSG Lanstroper See	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	8	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4411-901	Kurler Busch, Wickeder Holz, Buschei, NSG Alte	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	7	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4411-901	Kurler Busch, Wickeder Holz, Buschei, NSG Alte	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	27	54	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4411-901	Kurler Busch, Wickeder Holz, Buschei, NSG Alte	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		4	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-900	Wald- und Grünlandgebiete bei Bönen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	15	7	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-900	Wald- und Grünlandgebiete bei Bönen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	20	33	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-900	Wald- und Grünlandgebiete bei Bönen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	54	20	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-901	Mühlhausener Mark und Uelzener Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	6	54	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-901	Mühlhausener Mark und Uelzener Heide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	48	27	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-901	Mühlhausener Mark und Uelzener Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4412-901	Mühlhausener Mark und Uelzener Heide	<i>Triturus cristatus</i>	1166			1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4413-900	Wälder NW Oberense	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	33	45	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-900	Blögge	<i>Lampetra planeri</i>	1096	13		1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-900	Blögge	<i>Cottus gobio</i>	1163			1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-900	Blögge	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-900	Blögge	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-902	Salzbrink	Salzwiesen im Binnenland	1340	3	1	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-902	Salzbrink	<i>Cottus gobio</i>	1163			1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4414-902	Salzbrink	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4415-900	Buchenwälder um Mellrich	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	10	61	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4415-900	Buchenwälder um Mellrich	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	20	74	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4415-900	Buchenwälder um Mellrich	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen	8160		12	1996	D34	NW	eigene Erhebungen
4507-901	Ripshorster Wiesen	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	24	25,6	2002	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-908	Rombergpark, Rombergwiese, Tiergarten und	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	18	35	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-908	Rombergpark, Rombergwiese, Tiergarten und	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-910	Niederhofer Holz, Rombergholz, Großholthäuser Mark	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	281	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-910	Niederhofer Holz, Rombergholz, Großholthäuser Mark	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	45	6	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-910	Niederhofer Holz, Rombergholz, Großholthäuser Mark	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1990	D34	NW	eigene Erhebungen
4510-910	Niederhofer Holz, Rombergholz, Großholthäuser Mark	<i>Bombina variegata</i>	1193			1997	D34	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1099	3		1991	D34	NW	eigene Erhebungen
3807-901	Waldgebiete bei Wessum	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	20	45	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1042	1		2000	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	4	17	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Moorwälder	91D0	7	26	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	11	13	2000	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	32	33	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010		1	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510		2	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4006-900	Burlo-Vardingholter Venn	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		2	1990	D35	NW	eigene Erhebungen

4101-902	Wylter Meer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	8	26	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-900	Eltener Berg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	16	75 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-901	Halbinsel Salmorth	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	3	176 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-901	Halbinsel Salmorth	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	4	45	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-901	Halbinsel Salmorth	Triturus cristatus	1166	6	101 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-901	Halbinsel Salmorth	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	9	40	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-901	Halbinsel Salmorth	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		12 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-902	Die Moitjes	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	13	19 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-902	Die Moitjes	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Petromyzon marinus	1095	1	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	1	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Misgurnus fossilis	1145	1	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Lampetra fluviatilis	1099	1	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Cobitis taenia	1149	1	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Alosa alosa	1102	1	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Rhodeus sericeus amarus	1134	1	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4102-904	Rhein	Coregonus oxyrinchus	1113	3	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-900	Gewässersystem Grietherorter und Bienener Altrhein	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	1	168	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-900	Gewässersystem Grietherorter und Bienener Altrhein	Rhodeus sericeus amarus	1134	2	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-900	Gewässersystem Grietherorter und Bienener Altrhein	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	11	39 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-900	Gewässersystem Grietherorter und Bienener Altrhein	Triturus cristatus	1166		1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-901	Dornicker Ward	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	17	25	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-901	Dornicker Ward	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	17	34 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-901	Dornicker Ward	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		5 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-901	Dornicker Ward	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	1	75 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Alosa alosa	1102	2		D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	5	45 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	21	6 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	33	13	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-902	Fließgewässerverbund Kellener Altrhein, Volksgatt,	Triturus cristatus	1166		1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-903	Emmericher Ward	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	10	40 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-903	Emmericher Ward	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	18	31 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-903	Emmericher Ward	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	20	2	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-903	Emmericher Ward	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		9 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-903	Emmericher Ward	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-904	Die Hetter	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	1	38 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-904	Die Hetter	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	5	113 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-904	Die Hetter	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	15	11 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4103-904	Die Hetter	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-900	Bocholter Aa/Suderwicker Venn	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	12	15 1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-900	Bocholter Aa/Suderwicker Venn	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	25	18 1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-900	Bocholter Aa/Suderwicker Venn	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	28	6 1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-900	Bocholter Aa/Suderwicker Venn	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		3 1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und	Cottus gobio	1163	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und	Lampetra planeri	1096	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und	Cobitis taenia	1149	2	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und	Misgurnus fossilis	1145	2	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4104-901	Issel zwischen Hamminkeln und der NL-Grenze und	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	6	24 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4105-902	Hohenhorster Berge	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	10	3 1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4105-902	Hohenhorster Berge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		1 1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4201-900	Reichswald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	2	306	D35	NW	eigene Erhebungen
4201-900	Reichswald	Lucanus cervus	1083	3	1997 A	D35	NW	eigene Erhebungen
4201-900	Reichswald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	15	109 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4201-900	Reichswald	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen

4202-901	Kranenburger Bruch	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	7	5 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4202-901	Kranenburger Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	43	8 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4202-901	Kranenburger Bruch	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		5 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4202-901	Kranenburger Bruch	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-900	Wisseler Dünen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	3	33 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-900	Wisseler Dünen	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	10	4 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-901	Wald zwischen Schneppenbaum u. Moyland	Lucanus cervus	1083	4	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-901	Wald zwischen Schneppenbaum u. Moyland	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	22	53 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-901	Wald zwischen Schneppenbaum u. Moyland	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	40	9 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4203-901	Wald zwischen Schneppenbaum u. Moyland	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-900	Wittenhorster Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	43	11 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-900	Wittenhorster Heide	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		1 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-900	Wittenhorster Heide	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140		1 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-901	Gewässersystem Hagener Meer - Haffensche	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	9	26 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-901	Gewässersystem Hagener Meer - Haffensche	Triturus cristatus	1166		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-902	Kolke und Woyen bei Haffen-Mehr	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	16	12 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-904	NSG Gut Grind	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	27	17 2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-902	Kolke und Woyen bei Haffen-Mehr	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		4 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4204-902	Kolke und Woyen bei Haffen-Mehr	Triturus cristatus	1166		1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-900	Dingdener Heide	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140	5	11 1995	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-900	Dingdener Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	6	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-900	Dingdener Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	23	50 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-900	Dingdener Heide	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	44	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-900	Dingdener Heide	Trockene europäische Heiden	4030		22 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Lucanus cervus	1083	1	1001 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Leucorrhinia pectoralis	1042	2		D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	4	345 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Dystrophe Seen und Teiche	3160	4	2 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	8	4 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	8	2 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	7120	12	5 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		2 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140		4 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4205-901	Diersfordter Forst	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		8 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	6	224 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	6	12 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	7	3 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	11	72	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	13	36 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	21	2 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	22	6 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Triturus cristatus	1166		1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4206-900	Dämmerwald/Lichtenhagen	Übergangs- und Schwinggrasemoore	7140		3 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Moorwälder	91D0	18	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	31	9 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	41	9 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	44	9 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4302-900	Kendelaue südwestlich von Goch	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		3 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Lucanus cervus	1083	5	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	21	56 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	24	6 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Moorwälder	91D0		2 1996	D35	NW	eigene Erhebungen

4303-902	Berberheide, Maasbruch Kervenheim	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		2	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-900	Hochwald und Tüschewald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	5	190	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-900	Hochwald und Tüschewald	Lucanus cervus	1083	6		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-900	Hochwald und Tüschewald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	12	121		D35	NW	eigene Erhebungen
4304-901	Bislicher Insel	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	2	150		D35	NW	eigene Erhebungen
4304-901	Bislicher Insel	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	7	50	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-901	Bislicher Insel	Triturus cristatus	1166	7	101		D35	NW	eigene Erhebungen
4304-901	Bislicher Insel	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	21	30		D35	NW	eigene Erhebungen
4304-902	Die Hees	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	11	124	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-903	Grossenbusch/Bollendonks Ley	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	13	1	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-903	Grossenbusch/Bollendonks Ley	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	28	40	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-903	Grossenbusch/Bollendonks Ley	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	29	18	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4304-903	Grossenbusch/Bollendonks Ley	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Aspius aspius	1130	1			D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	2	55	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	2	200	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	6	63	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	8	20	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	11	21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	19	58	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	20	20		D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	26	21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150	21	21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Trockene europäische Heiden	4030	21	21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1		D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		21	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-900	Untere Lippeaue	Moorwälder	91D0		2	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-901	Schwarzes Wasser	Luronium natans	1831	1	0	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-901	Schwarzes Wasser	Dystrophe Seen und Teiche	3160	2	3	1995	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-901	Schwarzes Wasser	Leucorhinia pectoralis	1042	3			D35	NW	eigene Erhebungen
4305-901	Schwarzes Wasser	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	38	24	1995	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-901	Schwarzes Wasser	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1995	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-902	Droste Woy	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	2	1	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-902	Droste Woy	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	17	5	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-902	Droste Woy	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4305-903	Weseler Aue	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	1	2		D35	NW	eigene Erhebungen
4305-903	Weseler Aue	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	16	35		D35	NW	eigene Erhebungen
4305-903	Weseler Aue	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	45	6		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	1	470	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	1	62	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Lampetra planeri	1096	2		1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	2	33		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Misgurnus fossilis	1145	3		1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	3	278		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	4	93	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Leucorhinia pectoralis	1042	4		1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	5	5		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	6	18		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	9	2	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	11	3		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	13	80		D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	14	13	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-900	Kirchheller Heide, Köllnischer Wald und	Moorwälder	91D0		5	1996	D35	NW	eigene Erhebungen

4306-901	Kaninchenberge	Triturus cristatus	1166	8	101	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-901	Kaninchenberge	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	9	4 1986	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-901	Kaninchenberge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	36	25 1986	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-901	Kaninchenberge	Trockene europäische Heiden	4030		16 1986	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-902	Testerberge	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	2	2 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-902	Testerberge	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	17	64 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-902	Testerberge	Trockene europäische Heiden	4030		2 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-902	Testerberge	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	D35	NW	eigene Erhebungen
4306-902	Testerberge	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden	5130		3 1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4307-901	Gartroper Mühlenbach	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	9	5	D35	NW	eigene Erhebungen
4307-901	Gartroper Mühlenbach	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	12	65	D35	NW	eigene Erhebungen
4307-901	Gartroper Mühlenbach	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	14	32	D35	NW	eigene Erhebungen
4307-901	Gartroper Mühlenbach	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	20	7	D35	NW	eigene Erhebungen
4307-901	Gartroper Mühlenbach	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	35	28	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-900	Haagscher Wald Geldern	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	29	40 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-900	Haagscher Wald Geldern	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	1	1 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Myotis dasycneme	1318	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Misgurnus fossilis	1145	4	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Moorwälder	91D0	4	55 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	6	64 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	9	20 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Triturus cristatus	1166	9	101	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	10	128 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	14	1 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	14	18	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	30	15 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	32	9 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		5 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Trockene europäische Heiden	4030		1 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-901	Issumer Fleuth, Fleuthkuhlen Issum-Winnekendonk	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		64 1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Moorwälder	91D0	19	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	25	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	27	41 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	46	6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Trockene europäische Heiden	4030		6 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4403-902	Steprather Heide, Walbecker Sanddünen Walbeck	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1 1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4404-900	Die Leucht	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	3	378 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4404-900	Die Leucht	Moorwälder	91D0	5	32 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4404-900	Die Leucht	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	10	75	D35	NW	eigene Erhebungen
4404-900	Die Leucht	Trockene europäische Heiden	4030		22 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland	Osmoderma eremita	1084	1	1986	D35	NW	eigene Erhebungen
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	15	16	D35	NW	eigene Erhebungen
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	24	17 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		2 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4405-900	Auwälder am Ossenberger Feld und Deichvorland	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		22 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-900	Krummbeck-Scholtenbusch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	7	91 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-900	Krummbeck-Scholtenbusch	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	18	7 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-900	Krummbeck-Scholtenbusch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	24	50 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-900	Krummbeck-Scholtenbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		5 1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-901	Rheinaue Walsum	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	1	307 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-901	Rheinaue Walsum	Triturus cristatus	1166	4	1000 1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-901	Rheinaue Walsum	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	7	30	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-901	Rheinaue Walsum	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	34	13 1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4406-901	Rheinaue Walsum	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		10 1996	D35	NW	eigene Erhebungen

4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	26	46	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	26	8	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		1	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		2	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		2	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-900	Vlaßrather Bruch, Niersbruch Straelen	Moorwälder	91D0		4	1993	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	2	1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	34	30	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-901	Damerbruch, Terrassenfuß Straelen	Moorwälder	91D0		4	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Moorwälder	91D0	8	19	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	9	133	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	13	43	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	27	7	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	47	6	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		7	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4503-902	Niersniederung, Caenheide Straelen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	13	117	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Moorwälder	91D0	16	7	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	16	31		D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	18	54	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	42	9	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-900	Staatsforst Xanten Rheurdt	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		11	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-901	Waldkomplex Wachtendonk	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	26	6	1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-901	Waldkomplex Wachtendonk	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	39	22	1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4504-901	Waldkomplex Wachtendonk	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4505-900	Reyener Berg und Vluynbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	19	48	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4505-900	Reyener Berg und Vluynbusch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	25	48	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen	2310	1	100	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Vertigo moulinsiana	1016	1		1954	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	1	100	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	1	41	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	2	5		D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	2	62	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Moorwälder	91D0	2	95	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	3	54	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Rhodeus sericeus amarus	1134	3		1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	3	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Dystrophe Seen und Teiche	3160	3	3		D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	3	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	3	65	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	4	6		D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	5	321	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	5	84	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Leucorrhinia pectoralis	1042	5		1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Triturus cristatus	1166	5	500	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	7	12	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Lucanus cervus	1083	7		2000	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		299	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Lebende Hochmoore	7110		100	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150		100	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4603-900	IBA Schwalm-Nette-Platte und Grenzwald	Trockene europäische Heiden	4030		199	1996	D35	NW	eigene Erhebungen

4604-900	Niersaue	Moorwälder	91D0	1	99	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	2	99	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Cobitis taenia	1149	3		1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Rhodeus sericeus amarus	1134	4		1994	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	8	138	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	13	15	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Triturus cristatus	1166			1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4604-900	Niersaue	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		59	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Moorwälder	91D0	3	92	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	4	1		D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	6	1		D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	6	11	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	8	57	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-900	Orbroicher Bruch, Hülser Berg, Hülser Bruch und NSG	Triturus cristatus	1166			1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-901	Niepkuhlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	6	42	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-901	Niepkuhlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper	Moorwälder	91D0	20	6	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-901	Niepkuhlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	33	6	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-901	Niepkuhlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		14	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-901	Niepkuhlen, NSG Waldwinkelkuhle, NSG Nieper	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	Luronium natans	1831	2	0	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	5	14	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	Dystrophe Seen und Teiche	3160	5	1	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	Moorwälder	91D0		2	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-902	NSG "Egelsberg" und NW gelegener Laubwald	Trockene europäische Heiden	4030		22	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-903	NSG Latumer Bruch	Triturus cristatus	1166	1	5000		D35	NW	eigene Erhebungen
4605-903	NSG Latumer Bruch	Maculinea nausithous	1061	3	25	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-903	NSG Latumer Bruch	Moorwälder	91D0	21	6	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-903	NSG Latumer Bruch	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4605-903	NSG Latumer Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		4	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Maculinea nausithous	1061	4	9	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	11	50	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	31	15	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Triturus cristatus	1166			1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		12	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-901	Die Spey und Maigrund (Auenrest bei Stratum)	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des	3270		10	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-902	Überanger Mark und Forstbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	2	350	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4606-902	Überanger Mark und Forstbusch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	18	27	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	1	350	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Triturus cristatus	1166	2	1001		D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Leucorrhinia pectoralis	1042	6			D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	7	184	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Lucanus cervus	1083	8		1998	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Moorwälder	91D0	9	18	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	10	18	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4607-901	Waldgebiete W Hösel und N Ratingen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	26	18	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4705-900	Strümpfer Busch und NSG Der Meerbusch	Moorwälder	91D0	6	29	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4705-900	Strümpfer Busch und NSG Der Meerbusch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	19	26	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4705-900	Strümpfer Busch und NSG Der Meerbusch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4705-900	Strümpfer Busch und NSG Der Meerbusch	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	Maculinea nausithous	1061	1	150	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	Moorwälder	91D0	11	16	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	22	26	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	28	16		D35	NW	eigene Erhebungen
4706-900	NSG Ilvericher Altrheinschlinge	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		33	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4706-901	NSG Ölgangsinsel und S anschließende Kleingehölze	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	29	16	1989	D35	NW	eigene Erhebungen

4706-901	NSG Ölgangsinsel und S anschließende Kleingehölze	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		19	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4802-900	Heideflächen im Effelder Wald	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	15	1	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4802-900	Heideflächen im Effelder Wald	Trockene europäische Heiden	4030		7	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Moorwälder	91D0	13	8	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	20	23		D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	27	19	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	40	16	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4		D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Triturus cristatus	1166			1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-901	Helfensteiner Bachtal, Rothenbachtal	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		2	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	1	73	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	18	64	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	19	7	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	22	15		D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	23	20	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	30	14	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1		D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		7	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Moorwälder	91D0		5	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Triturus cristatus	1166			1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Trockene europäische Heiden	4030		28	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4803-902	NSG Schaagbachtal und ehem. Flugplatz	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4805-900	Erftaue N Grevenbroich	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	17	8	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4805-900	Erftaue N Grevenbroich	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	21	41	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4805-900	Erftaue N Grevenbroich	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	32	14	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4805-900	Erftaue N Grevenbroich	Triturus cristatus	1166			1985	D35	NW	eigene Erhebungen
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	3	1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	14	38	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	42	12	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		10	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
4806-900	Uedesheimer Rheinbogen, Himmelsberg	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		5	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-900	NSG Further Moor	Moorwälder	91D0	12	11	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-900	NSG Further Moor	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-900	NSG Further Moor	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-901	NSG Spörkelnbruch und Teil des Hildener Stadtwaldes	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	3	3	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-901	NSG Spörkelnbruch und Teil des Hildener Stadtwaldes	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	6	1		D35	NW	eigene Erhebungen
4807-901	NSG Spörkelnbruch und Teil des Hildener Stadtwaldes	Moorwälder	91D0		2	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	4	11	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Dystrophe Seen und Teiche	3160	6	1	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Leucorrhina pectoralis	1042	7		1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Moorwälder	91D0	22	6	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		3	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-902	NSG Ohligser Heide	Trockene europäische Heiden	4030		3	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Osmoderma eremita	1084	2		1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	4	130		D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	4	1		D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Maculinea nausithous	1061	6		1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	10	26	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	12	38	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		26	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des	3270		13	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-903	NSG Zonser Grind, NSG Urdenbacher Kämpen und	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		65	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-904	Teilfläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	7	1		D35	NW	eigene Erhebungen

4807-904	Teiffläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom	Moorwälder	91D0	10	17	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-904	Teiffläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010		1	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-904	Teiffläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom	Trockene europäische Heiden	4030		6	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
4807-904	Teiffläche NSG Hildener Heide-Süd+Sandberg SE vom	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		4		D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Lutra lutra	1355	1			D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Maculinea nausithous	1061	2	30	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Lampetra planeri	1096	3			D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	5	36	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Maculinea nausithous	1061	5	9	2000	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	15	38	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	19	4	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	36	12	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		8	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-900	Ruraue zwischen Linnich und niederländischer	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190		4	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-901	Wurmaue zwischen Geilenkirchen und Kempen	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	8	6	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-901	Wurmaue zwischen Geilenkirchen und Kempen	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	16	9	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-901	Wurmaue zwischen Geilenkirchen und Kempen	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	48	6	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4902-901	Wurmaue zwischen Geilenkirchen und Kempen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		12	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	2	92	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	3	94	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	4	307	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	9	79		D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	11	16	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Moorwälder	91D0	14	8	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4906-901	Staatsforst Benrath, Knechtsteder Busch, Chorbush	Triturus cristatus	1166			1988	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Vertigo moulinsiana	1016	2		1937 C	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Osmoderma eremita	1084	3		1933	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Moorwälder	91D0	15	8	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	35	13	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Triturus cristatus	1166			1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-900	NSG Worringer Bruch	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		16	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	Petromyzon marinus	1095	3			D35	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	27	6	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		4	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160		4	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-902	Dhünntal zwischen Leverkusen und Odenthal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-903	NSG Rheinaue Langel-Merkenich und NSG Flittarder	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	15	31	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-903	NSG Rheinaue Langel-Merkenich und NSG Flittarder	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	19	31	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4907-903	NSG Rheinaue Langel-Merkenich und NSG Flittarder	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		22	1992	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Petromyzon marinus	1095	4			D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	17	29	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	35	6	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Triturus cristatus	1166			1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-901	Wupperaue und -hänge mit Hüscheider Bachtal bei	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		1	1989	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Kalkreiche Niedermoore	7230	1	2	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Coenagrion mercuriale	1044	1	200	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	4	22	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	4	3	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	7	58	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	10	108	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	14	43	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	18	25	1982	D35	NW	eigene Erhebungen

4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	41	14	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2	1982	D35	NW	eigene Erhebungen
4908-910	Waldkomplex Dünnwald/Thielenbruch/Diepeschrath	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140		3		D35	NW	eigene Erhebungen
5002-900	Rimbunger Busch und Kanualbusch	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	5	19	1984	D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Dystrope Seen und Teiche	3160	1	6	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	3	14	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	8	1		D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140	8	5	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	16	1	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5002-901	NSG Teverener Heide	Trockene europäische Heiden	4030		8	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5004-900	Wald an der KFA Jülich und NSG	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	7	9	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5004-900	Wald an der KFA Jülich und NSG	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	12	99	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5004-901	Lindenberger Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	22	33	2002	D35	NW	eigene Erhebungen
5006-901	Koenigsdorfer Wald	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	1	126	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5006-901	Koenigsdorfer Wald	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	23	25	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5006-901	Koenigsdorfer Wald	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	30	36	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5006-901	Koenigsdorfer Wald	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4		D35	NW	eigene Erhebungen
5007-900	Nüssenberger Busch	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	10	54	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5007-900	Nüssenberger Busch	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	21	20	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-900	Dellbrücker Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und	2330	12	2		D35	NW	eigene Erhebungen
5008-900	Dellbrücker Heide	Trockene europäische Heiden	4030		45	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	5	1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	25	12	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	33	31	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	34	6	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	37	12	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-901	Mittelterasse zwischen Brück, Dellbrück u. Refrath	Trockene europäische Heiden	4030		18	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Callimorpha quadripunctaria	1078	1		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Luronium natans	1831	3	0		D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Lampetra planeri	1096	4		1983	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	4	211	1983	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	9	111		D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	14	113		D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	16	26		D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Bombina variegata	1193			1983	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Triturus cristatus	1166			1983	D35	NW	eigene Erhebungen
5008-903	Königsforst	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2		D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Lucanus cervus	1083	2	1	2000	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	7	22	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	18	5	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	21	23	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	23	18	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	24	25	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	37	25		D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Triturus cristatus	1166			1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Silikafelsen mit Pioniervegetation des	8230		5	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-900	Wurmaue N Worm und NSG Wurmthal	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		5	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-904	NSG Mittleres Broicherbachtal und NSG Quellgebiet	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	39	10	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-904	NSG Mittleres Broicherbachtal und NSG Quellgebiet	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		2	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5102-904	NSG Mittleres Broicherbachtal und NSG Quellgebiet	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		1	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Lutra lutra	1355	2		2002	D35	NW	eigene Erhebungen
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	4	40	1988	D35	NW	eigene Erhebungen
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	8	43	1988	D35	NW	eigene Erhebungen

5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	20	31 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	28	19 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	<i>Triturus cristatus</i>	1166		1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		12 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		31 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5104-900	Ruraue zwischen Linnich und Düren	<i>Castor fiber</i>	1337		1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-900	Reste des Hambacher Forstes S der A4	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	1	900 1984	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-901	Steinheide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	14	78 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-902	Nörvenicher Wald mit alter Burg	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	17	60 1984	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-903	Dickbusch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	11	100 1997	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-903	Dickbusch	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	31	35 1997	D35	NW	eigene Erhebungen	
5105-903	Dickbusch	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	38	12 1997	D35	NW	eigene Erhebungen	
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	6	239	D35	NW	eigene Erhebungen	
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	12	45 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	22	22	D35	NW	eigene Erhebungen	
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		12 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5106-900	Teil der Erftaue mit NSG-Parrig und NSG Kerpener	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des	3270		8 1988	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	3	328 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130	3	49 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	<i>Lucanus cervus</i>	1083	9	1998	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	Moorwälder	91D0	17	7 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	20	58	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	23	13	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	<i>Triturus cristatus</i>	1166		1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-902	Ville	<i>Dichelyma capillaceum</i>	1383		1997 A	D35	NW	Frahm, J.-P. & N.J. Strapper	1998
5107-903	NSG Wald-Seen Bereich Theresia	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	5	14	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-904	Heider Bergsee und Schluchtsee in der	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	3	19,2 2002	D35	NW	eigene Erhebungen	
5107-905	Ober-, Mittel- und Untersee in der Ville-Seenkette	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit	3140	4	19,1 2002	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	2	20 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> [Dünen	2310	2	41 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	2	15 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit	9190	2	450 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	<i>Salmo salar</i> (nur im Süßwasser)	1106	2	1997	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140	3	21 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	4	1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und	2330	4	15	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	7	170 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	8	82 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> ,	6510	9	55	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150	12	20 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus</i>	91E0	24	20 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	<i>Triturus cristatus</i>	1166		1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Moorwälder	91D0		5 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> ,	91F0		41 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260		2 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	<i>Bombina variegata</i>	1193		1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5108-900	Standortübungsplatz Wahner Heide	Trockene europäische Heiden	4030		370 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5109-901	Stallberger Teiche	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit <i>Erica</i>	4010	10	2 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5109-901	Stallberger Teiche	<i>Triturus cristatus</i>	1166	10	101	D35	NW	eigene Erhebungen	
5109-901	Stallberger Teiche	Torfmoor-Schlenken (<i>Rhynchosporion</i>)	7150		1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5109-901	Stallberger Teiche	Übergangs- und Schwinggrasmoore	7140		1 1996	D35	NW	eigene Erhebungen	
5204-906	Gürzenicher Bruch und Wälder am Fischbach	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110	6	110	D35	NW	eigene Erhebungen	
5204-906	Gürzenicher Bruch und Wälder am Fischbach	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	16	70	D35	NW	eigene Erhebungen	
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und	6230	1	80 1985	D35	NW	eigene Erhebungen	

5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit	3130	3	10	1985	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Triturus cristatus	1166	3	1001	1985	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica	4010	5	7		D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen	6410	6	1		D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	8	159	1985	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	15	36		D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Trockene europäische Heiden	4030		72	1985	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-900	Drover Heide und angrenzende Waldflächen	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		32	1985	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-901	Neffelbachaue bei Zülpich	Leucorrhinia pectoralis	1042	8			D35	NW	eigene Erhebungen
5205-901	Neffelbachaue bei Zülpich	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0		3	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-901	Neffelbachaue bei Zülpich	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		6	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5205-901	Neffelbachaue bei Zülpich	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis,	91F0		17	1991	D35	NW	eigene Erhebungen
5206-900	Brachflächen am Vilehang bei Bliesheim	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren	6210	5	1	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
5206-900	Brachflächen am Vilehang bei Bliesheim	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510		1	1987	D35	NW	eigene Erhebungen
5206-901	Friesheimer Busch	Triturus cristatus	1166	11	101		D35	NW	eigene Erhebungen
5206-901	Friesheimer Busch	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	15	75	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5206-901	Friesheimer Busch	Trockene europäische Heiden	4030		21	1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Dicranum viride	1381	1		1979	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	1	560	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	1	280	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Luronium natans	1831	4		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	5	307	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Lucanus cervus	1083	10		1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Triturus cristatus	1166			1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110		4	1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5207-900	Kottenforst	Bombina variegata	1193			1996	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Lampetra fluviatilis	1099	2		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Aspius aspius	1130	2		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Callimorpha quadripunctaria	1078	2		1995	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit	3260	2	79	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Petromyzon marinus	1095	2		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Salmo salar (nur im Süßwasser)	1106	3		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Rhodeus sericeus amarus	1134	5		1997	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,	6510	13	40	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus	91E0	19	25	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Subatlantischer oder mitteleuropäischer	9160	25	23	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und	6430		58	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5208-901	Untere Siegaue ab Hennef-Bödingen bis Einmündung	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des	3150		1	1990	D35	NW	eigene Erhebungen
5209-902	Tongrube bei Niederpleis	Triturus cristatus	1166	12	101	2000	D35	NW	eigene Erhebungen
5305-901	Ginnicker Bruch	Kalkreiche Niedermoore	7230	2	1		D35	NW	eigene Erhebungen
5305-901	Ginnicker Bruch	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten	7210	5	1	1997	D35	NW	eigene Erhebungen

Erläuterungen der Spalteninhalte: Spalte 1 enthält die Datenbanknummer des Gebietes, Spalte 2 dessen Namen. In Spalte 3 ist der wissenschaftliche Name (bei Arten) bzw. der Name des Schutzgutes, in der darauffolgenden Spalte der EU-Code aufgeführt. Die nächste Spalte führt für das Schutzgut den Rang des Gebietes innerhalb der Naturräumlichen Haupteinheit (Zst) auf, es folgt die Fläche (bzw. die Anzahl bei Arten) sowie das Jahr der Erhebung. Die letzten Spalten nennen die Naturräumliche Haupteinheit (NH), das Bundesland (BL) und die Quelle, ggf. mit dem Jahr des Erscheinens.